



ADMINISTRAÇÃO DE ENOXAPARINA (Clexane®, Volare®) Apresentações 20mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg

A enoxaparina possui uma apresentação em forma de seringa pronta para uso com o dispositivo de segurança para agulha que visa proteger aqueles que administram o medicamento. O uso da seringa completa a cada administração do medicamento garante que a dose prescrita e a administrada sejam as mesmas. Dessa forma, em alguns casos precisamos nos atentar a prescrição:

- Recomenda-se utilizar a dose completa da seringa evitando o fracionamento mesmo que a seringa seja graduada. Com isso, evitamos o risco de administração de dose incorreta acidentalmente.
- Caso sejam prescritas doses fracionadas (30mg, 50mg, 70mg, 90mg) é necessário validar com o prescritor para realizar o ajuste:

Dose Prescrita	Dose sugerida
50mg 12/12h	40mg 1xdia e 60mg 1xdia
70mg 12/12h	60mg 1xdia e 80mg 1xdia
90mg 12/12h	80mg 1xdia e 100mg 1xdia
Realizar o aprazamento de 1 seringa pela manhã e 1 pela noite, por exemplo: 40mg manhã e 60mg noite.	

- O farmacêutico deve entrar em contato com o prescritor na liberação da prescrição e recomendar o ajuste. Caso seja identificado pela enfermagem, o farmacêutico ou médico podem ser acionados para ajuste visando aumentar a segurança na administração.
- **PEDIATRIA:** pelo perfil dos pacientes na unidade as doses realizadas são, em sua maioria, menores do que a seringa de 20mg (menor dosagem). Assim, é realizada a retirada do medicamento da seringa original e transferida para uma seringa de insulina com o ajuste da dose. Esse processo é realizado pelo preparador. *Esta prática NÃO É HABITUAL nos demais andares da instituição.*