

FICHA DE INFORMAÇÕES FARMACOLÓGICAS

ESCOPOLAMINA ADESIVO TRANSDÉRMICO

1. Apresentação e Composição

Adesivos transdérmicos (Patches) contendo:

Hioscina (escopolamina).....1,5 mg

Veículo adesivo transdérmico 1 un

Veículo adesivo transdérmico: Etilcelulose, Polivinilpirrolidona, Dibutilftalato, PEG 6000, Laurato metila, Monolaurato sorbitan, Clorofórmio, Solução alcoólica mentol 0,5%.

2. Grupo Farmacológico

Anticolinérgico; bloqueio dos receptores muscarínicos presentes no centro do vômito e no trato gastrointestinal (músculo liso).

3. Receituário

Livre

4. Indicação

Antiespasmódico; tratamento de náuseas e vômitos induzidos por cinetose.

5. Mecanismo de Ação

A escopolamina inibe a ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos, sendo por isso uma droga anticolinérgica.

Quando existe náusea provocada por movimento, o que está acontecendo é uma confusão de mensagens recebidas pelo cérebro: a visão comunica que o meio envolvente é estacionário, enquanto o ouvido interno fornece a informação de que o ambiente está em movimento. O resultado destas informações antagônicas fornecidas ao cérebro é um mal-estar generalizado com sensação de vômito.

A escopolamina transdérmica bloqueia os impulsos nos centros nervosos no trato gastrointestinal e no centro da náusea, impedindo que o quadro de cinetose se faça sentir no paciente. Desta forma a chegada de mensagens contraditórias ao cérebro fica bloqueada e a náusea decorrente não ocorre.

6. Contraindicações

- Glaucoma de ângulo fechado;
- Hemorragia aguda;
- Íleo paralítico;
- Obstrução do trato gastrointestinal;
- Tireotoxicose;
- Taquicardia secundária a insuficiência cardíaca;
- Miastenia grave.

8. Efeitos Adversos

O efeito adverso mais conhecido é a sensação de boca seca. No entanto, este sintoma acaba se tornando também uma indicação e portanto ele só é um efeito secundário em pacientes que utilizem a escopolamina para tratamento de náusea por movimento. Nestes casos, a sensação dura um curto espaço de tempo e tem uma severidade pouco significativa.

Alguns pacientes também poderão sentir irritação da pele na área onde o adesivo é aplicado, sonolência, tonturas e visão turva. Aumento da temperatura corporal, confusão e agitação também se poderão fazer sentir em alguns casos.

Alterações da visão, com sensação de pressão ocular, são uma forte indicação de glaucoma e um médico deve ser contatado rapidamente.

Um efeito raro mas que também carece de intervenção médica imediata é o aparecimento de alucinações. Nestas situações o adesivo deve ser removido imediatamente e uma análise clínica deve ser conduzida com a maior brevidade possível.

9. Referências Bibliográficas

SANTOS, L.; TORRIANI, M. S.; BARROS, E. **Medicamentos na Prática da Farmácia Clínica**. Artmed Editora Ltda., 2013.

Package Leaflet information for the user - Scopoderm 1.5mg Patches, EMC (2016)

URL: medicines.org.uk

Scopoderm 1.5 mg Patch, (2016)URL: medicines.org.uk

Medicines Information: Product details Scopoderm, MHRA (2015)-URL: mhra.gov.uk