

Informações de contato do meu médico

Nome do médico:

Número de telefone:

Meu nome:

Número de telefone:

Em caso de emergência, entre em contato com (nome / telefone):

IMPORTANTE!

Nivolumabe pode causar efeitos colaterais sérios que precisam ser tratados imediatamente.

Ligue imediatamente para o seu(sua) médico(a) se você apresentar qualquer um destes sinais ou sintomas:

- **Pulmões:** dificuldades para respirar ou tosse.
- **Intestino e estômago:** diarreia (fezes aquosas, soltas ou moles), muco ou sangue nas fezes, fezes de coloração escura, dor de estômago ou na área abdominal.
- **Fígado:** coloração amarelada dos olhos ou pele (icterícia), dor ao lado direito da área do estômago e cansaço.
- **Rins:** volume reduzido de urina.
- **Diabetes / cetoacidose diabética:** sede, aumento de apetite com perda de peso, sensação de cansaço, sonolência, depressão, fraqueza, irritabilidade, mal-estar geral e quantidade extremamente aumentada de urina.
- **Pele:** erupção cutânea grave com ou sem coceira, bolhas, descamação, úlcera, pele seca e nódulos na pele.
- **Glândulas produtoras de hormônios:** cefaleia, visão borrada ou dupla, fadiga, cansaço, alterações de peso, alterações de comportamento (diminuição da libido, irritabilidade, esquecimento)
- **Coração:** dor no peito, batimentos cardíacos irregulares, palpitações
- **Músculos:** dor muscular, rigidez, fraqueza, fadiga grave
- **Outros:** dor e vermelhidão no olho, problemas de visão, visão turva, inflamação do pâncreas com dor abdominal superior, diminuição do apetite, náuseas ou vômitos, indigestão (azia), dor ou dormência ou fraqueza nos músculos das pernas e braços ou dificuldade de andar, febre, linfonodos inchados, sinais e sintomas de inflamação no cérebro, que pode incluir dor de cabeça, febre, convulsão, rigidez no pescoço, cansaço, confusão, fraqueza e tontura.

Bristol-Myers Squibb



Bristol-Myers Squibb
Todos os direitos reservados.
Material integrante do Plano de
Gerenciamento de Risco de Nivolumabe.
Versão 3 – Março / 2018
10BR1801778

OPDIVO®
(nivolumabe)

Solução injetável para infusão intravenosa

Cartão de Alerta do Paciente

Este cartão contém informações de segurança importantes das quais você precisa estar ciente antes e durante o tratamento com nivolumabe ou nivolumabe em combinação com ipilimumabe.

Como qualquer outro medicamento, esse tratamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os pacientes os apresentem. O seu médico irá conversar com você sobre esses efeitos colaterais e sobre os riscos e benefícios do seu tratamento.

Mantenha este cartão com você e mostre-o aos médicos envolvidos em seu tratamento, não apenas ao seu médico oncologista responsável pela prescrição.

Bristol-Myers Squibb

IMPORTANTE!

- O tratamento precoce dos efeitos colaterais reduz a probabilidade do tratamento com nivolumabe ou nivolumabe em combinação com ipilimumabe precisar ser temporariamente ou permanentemente interrompido, o que permite aos pacientes obter o máximo benefício do tratamento.
- Sintomas que parecem leves podem piorar rapidamente se não forem tratados.
- Não tente tratar seus sintomas com outros medicamentos por conta própria.
- Informe imediatamente ao seu médico se apresentar quaisquer sintomas.
- Os sinais e sintomas podem acontecer a qualquer momento e, às vezes, ocorrem tardiamente, isto é, podem desenvolver semanas ou meses após a sua última dose.
- Mantenha este cartão com você e mostre-o aos médicos envolvidos em seu tratamento, não apenas ao seu médico oncologista responsável pela prescrição.

Informe ao(a) seu(sua) médico(a) se você:

- souber que é alérgico a nivolumabe ou qualquer outro medicamento
- apresentar uma doença autoimune
- apresentar melanoma no olho
- utilizou previamente ipilimumabe ou outro medicamento e apresentou efeitos colaterais graves
- tiver recebido a informação de que o câncer avançou para o cérebro
- estiver tomando qualquer medicamento que suprima o sistema imunológico
- tiver recebido um transplante (nivolumabe pode causar rejeição a transplantes de órgãos, como rim, fígado, coração, córnea ou pele)
- tiver recebido um transplante alogênico (de outra pessoa) de medula óssea ou transplante de células-tronco
- apresentar um histórico de inflamação nos pulmões
- estiver grávida, planejando engravidar ou estiver amamentando
- estiver tomando ou tenha tomado qualquer outro medicamento recentemente
- estiver fazendo uma dieta com baixo teor de sódio (pouco sal)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES Para profissionais da saúde

- Este paciente está sendo tratado com nivolumabe ou nivolumabe em combinação com ipilimumabe.
- Reações adversas imunorrelacionadas podem aparecer a qualquer momento durante o tratamento ou meses após sua descontinuação.
- Diagnóstico precoce e manejo adequado são essenciais para minimizar as complicações que ameaçam à vida. Diretrizes específicas para o manejo de eventos adversos imunorrelacionados estão disponíveis.
- Entre em contato com um oncologista ou outro especialista que possa auxiliar no gerenciamento de eventos adversos imunorrelacionados em órgãos específicos.

Efeitos colaterais também devem ser relatados à Bristol-Myers Squibb (0800 727 6160 ou sac.brz@bms.com).



Referência: 1. Bula do produto OPDIVO® (nivolumabe)

Consulte a bula do produto nivolumabe no site www.bms.com/br ou entre em contato para mais informações (0800 727 6160 ou sac.brz@bms.com).