


INFORMAÇÕES DE MEDICAMENTOS

Preparo e administração intradialítica de medicamentos

Noripurum 100mg/5mL (sacarato de óxido férrico)



Preparo

Aspirar a ampola e completar com soro fisiológico 0,9% para completar volume de 10mL.

Ferinject 500mg/10mL (carboximaltose férrica)




Preparo

Aspirar todo o conteúdo da ampola.


Administração

Administrar em bomba seringa acoplada à máquina de hemodiálise em velocidade de infusão de 10mL/hora.

Lembre-se de alterar a modalidade de hemodiálise para HD e programar tempo de paragem da bomba para 0,01 para garantir a administração completa do medicamento.



Estabilidade



Considerando o preparo à beira-leito dessas soluções, conforme a Farmacopeia Americana (USP 797) podemos considerá-la como uma solução de preparo imediato que possui estabilidade microbiológica de **no máximo 4 horas**.

Sempre que possível opte pelo preparo desse medicamento em momento mais próximo da administração.

Atualização: 10/2023 – Responsáveis: Farmácia e Enfermagem. Validado pela coordenação médica e de enfermagem.

INFORMAÇÕES DE MEDICAMENTOS

Preparo e administração intradialítica de medicamentos



Vitamina C 1g/5mL



Complexo B 1mL




Zemplar 5mcg/3mL
(paricalcitol)


Preparo

Aspirar a dose prescrita pelo médico.

Administrar em bolus no acesso do catabolha da máquina de hemodiálise.



Estabilidade e Compatibilidade



Considerando o preparo à beira-leito dessas soluções, conforme a Farmacopeia Americana (USP 797) podemos considerá-la como uma solução de preparo imediato que possui estabilidade microbiológica de **no máximo 4 horas quando preparadas separadamente e protegidas da luz.**



Não há respaldo na literatura para a administração de Complexo B e Vitamina C na mesma seringa. Portanto, caso seja necessário administrar na mesma seringa, recomenda-se preparar imediatamente antes da administração (no máximo 30min antes).

Administrar Zemplar sempre separado dos demais medicamentos.

Atualização: 10/2023 – Responsáveis: Farmácia e Enfermagem. Validado pela coordenação médica e de enfermagem.


INFORMAÇÕES DE MEDICAMENTOS

Preparo e administração intradialítica de medicamentos




Eprex 4.000UI,
8.000UI, 10.000UI
(seringa pronta para o uso)

Administrar em bolus no set venoso da máquina de hemodiálise.



Eprex 40.000UI
(seringa pronta para o uso)


Administrar exclusivamente por via subcutânea.



Albumina humana 20%
(frasco de 50mL)

Preencher o equipo macro antes de infundir no sistema e com o auxílio de uma torneirinha, conectar o equipo macro na linha arterial.

Administrar em bolus (equipo aberto).



Atualização: 10/2023 – Responsáveis: Farmácia e Enfermagem. Validado pela coordenação médica e de enfermagem.