



Medicamentos obstrutores de dispositivos enterais e alternativas para substituição

NOME COMERCIAL	PRINCÍPIO ATIVO	RECOMENDAÇÃO
Centrum® comprimido	Polivitaminico /Poliminerais	Sugerir protovit.
Citoneurim® Drágea	Tiamina / Piridoxina / Cianocobalamina	Sugerir a opção injetável IM.
Claritromicina®250 mg/5ml Suspensão Pediátrica	Claritromicina	Devido a viscosidade, preferir a opção comprimido, diluir em 20ml a 30ml de água mineral
Cymbalta® 30mg	Duloxetine, Clorid.	Consultar farmacêutico para propor alternativa terapêutica fluoxetina gotas e/ou monitorar efeito.
Cymbalta® 60mg		
Depakote®ER 500 mg	Divalproato de Sódio	Sugerir a opção de comprimido simples ou Valproato de sódio (Depakene).
Depakote Sprinkle® 125mg		
Efexor XR® 37,5 mg	Venlafaxina	Sugerir a opção não padrão em Cp (Biossintética) ou manipulação. (Neste caso tem que reavaliar a dose e posologia).
Efexor XR® 75 mg		
Glifage® XR 500mg	Metformina	Sugerir a opção comprimido simples e monitorar.
Glifage® XR 750mg		
Metamucil®	Psyllium Plantago	Sugerir Guttalax (picossulfato de sódio) - Diluir em 10ml de água mineral.
Muvinlax®	Macrogol/ Bic.Sódio/ Cl. Potássio/ Cl.Sódio	Sugerir Guttalax (picossulfato de sódio) - Diluir em 10ml de água mineral.
Naturetti®	Sena / Tamarindo / Alcaçuz	Sugerir Guttalax (picossulfato de sódio) - Diluir em 10ml de água mineral.
Lactulona®	Lactulose	Sugerir Guttalax (picossulfato de sódio) - Diluir em 10ml de água mineral.
Losec Mups® 40mg	Esomeprazol magnésio	Sugerir a opção Nexium®. Medicamento dispersível, após a diluição do comprimido inteiro em 20 ml de água mineral, aspire a seringa e homogenize a seringa antes de administrar.
Nujol®	Óleo mineral	Sugerir Guttalax (picossulfato de sódio) -Diluir em 10ml de água.
Omeprazol® 20 mg	Omeprazol	Sugerir a opção Nexium®. Medicamento dispersível, após a diluição do comprimido inteiro em 20 ml de água mineral, aspire a seringa e homogenize a seringa antes de administrar.
Oxycontin® 10 mg	Oxicodona	Monitorar efeito terapêutico.
Oxycontin® 20 mg		
Pantozol® 20 ou 40mg	Pantoprazol	Sugerir a opção Nexium®. Medicamento dispersível, após a diluição do comprimido inteiro em 20 ml de água mineral, aspire a seringa e homogenize a seringa antes de administrar.
Prolopa® HBS.	Levodopa/benserazida	Sugerir a opção comprimido dispersível e diluir em 25 a 50 ml de água mineral.
Secotex ®	Cloridrato de tansulosina	Sugerir a opção solução e consultar o farmacêutico.
Slow-k® 600 mg	Cloreto de Potássio	Sugerir a opção xarope Ionclor.
Sorcal®30mg	Poliestirenosulfonato de Cálcio	Avaliar a necessidade e possibilidade da administração via retal.
Tamarine geléia®	Senna alexandrina Miller+ Cassia fistula L.	Sugerir Guttalax (picossulfato de sódio) - Diluir em 10ml de água mineral.