



**HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS**



Educação do Paciente/Familiar

Doença Arterial Coronariana (DAC)



Orientação farmacêutica:

Mesmo com todos os cuidados que já apresentamos para você, os remédios são muito importantes no seu tratamento. É importante saber sobre alguns cuidados especiais com eles para que tudo dê certo – lembrando de sempre seguir a prescrição médica!



Uso de remédios:

Os remédios para a manutenção do tratamento após angioplastia ou cirurgia de revascularização miocárdica devem ser tomados sempre no mesmo horário. Caso esqueça uma dose, tome a próxima dose assim que se lembrar. Porém, se você se lembrar muito perto da próxima dose, pule a dose esquecida. Não tome duas doses ao mesmo tempo ou doses extras, isso pode aumentar o risco de reações adversas, sem benefício no seu tratamento. Utilize alarmes ou despertadores para não se esquecer de tomar seus remédios. Mantenha uma lista de todos os remédios prescritos sempre com você. Continue tomando os remédios receitados pelo médico, mesmo que você se sinta melhor. Somente o seu médico poderá avaliar se uma redução da dose ou a suspensão do remédio trará benefícios para você. Se os sintomas ou sua condição não melhorarem ou piorarem, entre em contato com o seu médico.



Antiagregante plaquetário:

Ácido Acetilsalicílico, Clopidogrel, Prasugrel e Ticagrelor. Esses remédios são responsáveis por diminuir a aglomeração de plaquetas presentes no sangue e, assim, dificultam a formação de coágulos. Dessa forma, deixam o sangue mais fluido.



Antes de iniciar o tratamento com um desses remédios, informe o seu médico:

- Se você é alérgico a esse remédio. Informe sobre a alergia e os sinais que teve;
- Se você tem algum dos seguintes problemas de saúde: asma, problemas de sangramento, pólipos nasais ou irritação nasal, doença renal, doença hepática, histórico de hemorragia ou úlcera gastrointestinal;
- Se você estiver tomando outro remédio que contenha o mesmo princípio ativo;
- Se você estiver tomando algum anti-inflamatório não esteroidal (por exemplo: Diclofenaco, Ibuprofeno, Cetoprofeno etc.).



Informe ao seu médico se você apresentar os seguintes sintomas:

- Sinais de uma reação alérgica (erupção na pele, urticária).
- Sinais de sangramento (vômito ou tosse com sangue, fezes escurecidas, sangramento das gengivas, sangramento vaginal anormal, hematomas sem causa ou que ficam maiores).



Quais são alguns outros efeitos colaterais desses remédios?

- Dor de estômago ou azia;
- Sensação de falta de ar ou respiração pesada (Ticagrelor).



Onde e como devo guardar e/ou desprezar o remédio?

Guarde-o longe do alcance de crianças e de pessoas que não estejam com plena capacidade mental, em local seco, em temperatura ambiente e protegido da luz. Armazene-o na embalagem original para protegê-lo da umidade. Jogue o remédio fora se estiver vencido. Quando for necessário descartá-lo, não utilize o lixo comum ou o vaso sanitário. Acesse o QR Code ao lado e confira os locais mais próximos que recebem materiais e remédios para descarte. Sua atitude contribuirá com o meio ambiente e a segurança de todos.

Acesse o QR Code e insira seu CEP para descobrir as farmácias mais próximas:



Dúvidas:

Use esse remédio conforme prescrito pelo seu médico. Em caso de dúvidas sobre remédios, o serviço de **Farmácia do Hospital Sírio-Libanês** disponibiliza o **Núcleo de Assistência Técnica e Educação Farmacêutica (NATEF)** para que os farmacêuticos possam esclarecê-las.

E-mail: natef@hsl.org.br | Telefone: (11) 3394-4955.

Farmacêutico Clínico:		
Data:	Celular Corporativo:	Telefone:
		(11) 3394-4955



**HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS**



Comitê de Ativação e
Educação do Paciente