

Medicamentos **PROIBIDOS** para dispensação via tubo pneumático



Medicamentos que possam sofrer alterações

do princípio ativo ou veículo, seja por desnaturação ou agregação de proteínas ou quebra (separação de fases) de emulsões. Sempre considerar a orientação do fabricante descrita no rótulo “Não agitar”.
Risco de desvio de qualidade.



Medicamentos refrigerados

O transporte via tubo não garante a temperatura necessária de 2°C a 8°C.
Risco de desvio de qualidade.



Medicamentos com risco ocupacional (oral ou injetável)

Risco de contaminação do tubo em caso de quebra acidental, pode haver contaminação do sistema do tubo pneumático.



Medicamentos em aerossóis

com mais de 70mL de volume.
Risco de explosão da embalagem.



Medicamentos de alto custo e/ou difícil aquisição

Risco de extravio do medicamento.



Produtos que excedam o peso ou tamanho recomendados

Peso de até 1Kg, respeitando as dimensões adequadas para inserção na capsula, preservando a embalagem. Volume máximo de 1L e 100mL para frasco de vidro. Risco de rompimento/quebra da embalagem e contaminação do sistema pneumático.
Risco de perda por dano na embalagem.

Exemplos padronizados:

Abatacepte ¹	Complexo Protrombínico ¹	Insulina ¹
Adalimumabe ^{1,2}	Eculizumabe ^{1,2}	Liraglutida ^{1,6}
Aflibercepte ^{1,2}	Eritropoetina ¹	Octreotida ²
Albumina ¹	Fator VII ¹	Pegfilgrastim ^{1,2}
Alprostatil ¹	Filgrastim ¹	Propofol ^{1,4}
Alteplase ^{1,2}	GANciclovir ⁶	Rasburicase ¹
Anfotericina B ^{1,2}	Glucagon ²	Tirotropina ²
Aprepitante ^{1,4}	Golimimumabe ^{1,2}	Tocilizumabe ^{1,2}
Basiliximabe ^{1,2}	Imunoglobulina ^{1,2}	Toxina Botulinica ^{1,2}
CiclosPORINA ¹	InFLIXimabe ^{1,2}	Vacinas ¹
Cidofovir ⁶		

1.Alteração do princípio ativo 2.Alto custo 4.Emulsão; 5.Aerossol com mais de 70mL 6.Perigoso, não antineoplásico, formas de dosagem líquidas e parenterais.