

MANUAL PARA ADMINISTRAÇÃO **DE MEDICAMENTOS POR ACESSOS ENTERAIS**

Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)

2013



HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS

APRESENTAÇÃO

Este manual é uma iniciativa da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) do Hospital Sírio-Libanês e voltado a todos os profissionais da saúde que cuidam de pacientes com acessos enterais.

Seu objetivo é sistematizar, de forma simples e prática, regras para dissolução e administração de uma ampla gama de medicamentos por meio de diferentes tipos de acessos enterais.

A meta final é conseguir maior durabilidade dos acessos enterais, bem como aperfeiçoar a segurança e a eficiência na administração de medicamento por meio dessas ferramentas, tanto para o paciente quanto para o profissional envolvido no processo.

ELABORAÇÃO

Doutor Paulo César Ribeiro
Doutor José Luiz Alvim Borges
Enfermeira Mairy Jussara de Almeida Poltronieri
Enfermeira Thaiz Angélica Franzoni da Silva
Farmacêutica Livia Maria Gonçalves Barbosa
Nutricionista Fabiana Ruotolo

INTRODUÇÃO

O uso de nutrição enteral é um procedimento intra-hospitalar comum em todos os pacientes que não conseguem se alimentar pela via usual mas, ainda assim, podem fazer uso, pelo menos parcialmente, do trato gastrointestinal. O acesso ao trato gastrointestinal é condição obrigatória e pode exigir desde um procedimento relativamente simples, como a passagem de uma sonda nasogástrica à beira do leito, até atitudes mais complexas, como a colocação de uma sonda nasoenteral por via endoscópica ou mesmo uma gastrostomia ou jejunostomia por via endoscópica ou cirúrgica. O sucesso da terapia nutricional depende em parte de manter os acessos enterais em boas condições de funcionamento, pelo tempo mais longo possível e da forma mais segura para o paciente.

Vários motivos tornam o acesso enteral impróprio para uso, como deslocamento por tração inadvertida, acotovelamento, infecção, vazamento, ruptura e obstrução. Com o advento dos acessos enterais menos calibrosos, os eventos obstrutivos são uma ocorrência frequente, obrigando muitas vezes o paciente

a ser submetido a uma nova passagem de acesso, o que aumenta o desconforto, os custos e a morbidade, pois alguns procedimentos são complexos como, por exemplo, endoscopia sob sedação endovenosa.

A administração de medicamentos por meio de acessos enterais é uma das causas comuns de obstrução.

Este manual, desenvolvido pela Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) do Hospital Sírio-Libanês, tem como objetivo orientar os profissionais de saúde envolvidos nessa prática sobre as maneiras mais adequadas de administrar uma gama de medicamentos por meio de acessos enterais. O conhecimento das formas mais adequadas de dissolução, trituração e administração, assim como das formas farmacêuticas mais apropriadas, favorece a manutenção do acesso em condições ideais de funcionamento por tempo mais prolongado, preservando o conforto e a segurança do paciente.

Papel do médico

- Estar atento no momento da prescrição médica, para escolher, na relação dos medicamentos necessários, as formas farmacêuticas que mais se adequam à administração por acessos enterais.
- Estar alinhado com os outros profissionais envolvidos para benefício do paciente.

O objetivo final é a preservação funcional do acesso sem prejuízo do tratamento.

Papel do enfermeiro

- Analisar o medicamento prescrito e validar a possibilidade de administração por via enteral com uso de sondas ou estomias, mediante consulta no manual. Caso não seja recomendada a administração, o enfermeiro deve entrar em contato com o médico e/ou farmacêutico para substituição do medicamento, forma farmacêutica, via ou dose.
- Supervisionar e orientar auxiliares/técnicos de enfermagem quanto ao processo de preparo e administração dos diferentes tipos de forma farmacêutica descritos no manual.
- Adequar a velocidade de infusão da dieta quando forem prescritos medicamentos que necessitem de pausa alimentar para administração.
- Orientar e supervisionar auxiliares/técnicos de enfermagem para a manutenção adequada do acesso enteral a fim de evitar obstruções decorrentes da administração incorreta de medicamentos.

Papel do nutricionista clínico

- Identificar as interações entre medicamentos e alimentos e avaliar sistematicamente a prescrição quanto a possíveis interações indesejadas com o intuito de minimizar riscos ao paciente e otimizar o tratamento.
- Participar ativamente da educação de pacientes e familiares, no caso das interações com dipiridamol, IMAO e anti-coagulantes orais, entregar por escrito as recomendações necessárias.

Papel do farmacêutico clínico

- Analisar a oportunidade de adaptação da terapia de acordo com a necessidade do paciente, por meio de adequações de formas farmacêuticas.
- Sugerir ao médico alternativas terapêuticas quando não for possível o ajuste de forma farmacêutica.
- Fornecer informações atualizadas e seguras em relação a medicamentos e sua utilização por via enteral.

Medicamentos via sonda

Escolha da forma farmacêutica adequada

Quando um medicamento que habitualmente é administrado por via oral precisa ser aplicado por meio de um acesso enteral, os seguintes quesitos devem ser avaliados:

- Sítio de absorção e de ação do fármaco;
- Efeitos da nutrição enteral na absorção do fármaco, bem como o tipo de acesso e sua localização no trato gastrointestinal (TGI);

- Possibilidade de substituição do medicamento (forma farmacêutica, via de administração ou fármaco alternativo).

Considerações sobre os Medicamentos

Para administrar um medicamento por sonda de forma correta, devemos levar em conta uma série de normas e precauções, pois ao modificar a forma farmacêutica original, alteram-se as propriedades farmacocinéticas, podendo o medicamento não alcançar os níveis terapêuticos adequados.

Problemas derivados de uma atuação incorreta:

- | |
|--|
| • Diminuição das doses do fármaco administrado |
| • Alteração das características farmacocinéticas |
| • Diminuição do efeito terapêutico |
| • Aumento dos efeitos adversos |
| • Obstrução da sonda |
| • Ocorrência de efeitos secundários intestinais |
| • Suspensão do suporte nutricional |

Recomendações gerais

Considerações sobre a forma farmacêutica

Em geral, deve-se tentar empregar a forma farmacêutica líquida. Em alguns casos, pode ser necessário o empregar de uma fórmula pediátrica, recorrer a formulações extemporâneas ou substituir o princípio ativo por outro disponível na forma líquida. Quando for necessário o uso de formas farmacêuticas sólidas, deve-se fazer trituração e dissolução adequadas para favorecer a

absorção e evitar a obstrução da sonda, lavando bem a sonda antes e depois da administração para evitar que partículas do fármaco fiquem aderidas a ela.

Considerações sobre possíveis interações

Interação medicamento-nutriente

As interações medicamento-nutriente têm grande importância clínica, uma vez que comprometem a eficiência da terapia medicamentosa e/ou a absorção de nutrientes. As interações podem ser divididas em farmacocinéticas e farmacodinâmicas.

As farmacocinéticas são as mais comuns, pois os alimentos são capazes de afetar absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos. Quanto às farmacodinâmicas, existem poucos relatos sobre o efeito de alimentos ou derivados capazes de agir em receptores e interferindo na ação do fármaco.

Para reduzir as interações, sugere-se que os medicamentos sejam administrados separadamente e que nunca sejam incorporados à nutrição enteral. Quando o paciente recebe nutrição enteral intermitente, a recomendação geral é aproveitar as pausas alimentares para administrar os medicamentos. Quando a administração da dieta enteral é contínua e há a possibilidade de interação medicamento-nutriente, deve-se respeitar uma pausa alimentar de em média uma hora antes e uma hora depois da administração do referido fármaco. É importante a verificação do horário de administração dos medicamentos, ajustando com os horários de administração da nutrição enteral ou suplementos.

Tipos de interação

Medicamento-nutrição enteral

Farmacocinéticas

Incompatibilidade físico-química

Quando a combinação do medicamento com a fórmula nutricional altera as características físico-químicas do medicamento.

Incompatibilidade farmacêutica

Quando a alteração da forma farmacêutica original, como por exemplo, trituração e dissolução modificam a eficácia do medicamento ou a tolerância deste.

Farmacodinâmicas

Quando ocorrem alterações da ação farmacológica do medicamento, bem como das propriedades nutricionais da dieta. Esse tipo de interação influencia principalmente os mecanismos de antagonismo farmacológico ou os sistemas de transporte celular.

Incompatibilidade farmacológica

Quando a ação de um fármaco provoca uma alteração da tolerância à nutrição enteral ou quando esta interfere com a eficácia do fármaco administrado.

Entre as manifestações clínicas desse tipo de incompatibilidade, estão:

- Diarreia
- Diminuição da motilidade do TGI
- Náusea e vômitos
- Antagonismo.

Interação fármaco-fármaco

Ao administrar mais de um fármaco, é recomendado fazê-lo de forma separada, imediatamente após a sua preparação (trituração e/ou dissolução). Nos casos de formas líquidas, recomenda-se administrar primeiro os preparados de menor viscosidade. O acesso enteral deve ser lavado internamente com água entre um e outro medicamento a ser administrado.

Formas farmacêuticas orais e recomendações para administração por sonda

Comprimidos



Simples:

Revestidos com cobertura para mascarar o sabor.
Podem ser triturados até a obtenção de pó fino.



Liberção retardada / prolongada / controlada (CR, MR, XR):

A trituração de comprimidos de liberação retardada faz com que todo o fármaco destinado a ser liberado em um período prolongado de tempo atue de forma imediata, originando níveis plasmáticos altos do fármaco no início e níveis muito baixos no final do intervalo terapêutico.
Não devem ser triturados.

**Liberação entérica:**

A destruição da capa protetora pode provocar a inativação do princípio ativo no estômago ou irritação da mucosa gástrica.

Não devem ser triturados.

Podem ser administrados quando o acesso enteral estiver pós-pilórico.

**Efervescentes:**

Devem ser dissolvidos em água e administrados ao término da efervescência.

Não devem ser triturados.

**Sublinguais:**

Sua administração por sonda não é recomendada. Deve ser mantida a via sublingual.

Atenção às situações de rebaixamento do nível de consciência, que podem favorecer a broncoaspiração inadvertida do medicamento.

**Cápsulas de gelatina dura (contendo pó):**

Abrir a cápsula, dissolver o conteúdo em água e administrar.

Em caso de princípios ativos muito irritantes, essa ação não é recomendada.

**Cápsulas de gelatina dura (contendo microgrânulos de liberação retardada ou liberação entérica):**

As cápsulas podem ser abertas, mas os microgrânulos não devem ser triturados, pois perdem suas características.

A disponibilidade de administração por sonda depende em parte do diâmetro dos microgrânulos e da sonda.

Não devem ser trituradas.

**Cápsulas de gelatina dura (contendo líquido):**

Pode-se optar por extrair o líquido com uma agulha e seringa.

Tal procedimento, no entanto, pode ocasionar efeito incompleto do medicamento ou por aspiração incompleta deste ou por aderência do medicamento às paredes do acesso enteral ou da seringa.

Deve-se buscar alternativa terapêutica.

Considerações sobre a forma farmacêutica

Nos comprimidos revestidos, o fármaco está no centro, em um núcleo, e é coberto por uma concha, isto é, uma camada de cera que serve para:

- 1) proteger fármacos perecíveis da decomposição;
- 2) mascarar gosto ou odor desagradáveis;
- 3) facilitar a introdução ou deglutição;
- 4) permitir codificação por coloração.

Para fármacos ácido-lábeis, é usado um revestimento de cera ou de polímero de acetato de celulose para evitar a desintegração da forma sólida no estômago. Como consequência, a desintegração e a disponibilidade do princípio ativo ocorrem no duodeno.

Dependendo da maneira como o comprimido é preparado, o princípio ativo pode ser programado para ser liberado no duodeno, intestino delgado ou cólon. Quando a intenção é que o princípio ativo mantenha um nível sérico adequado por tempo prolongado, usa-se uma formulação de absorção lenta ou retardada. Quando esses comprimidos são triturados ou dissolvidos, essas propriedades são perdidas.

Administração de medicamentos

A obstrução dos acessos enterais pode causar inúmeros inconvenientes, entre eles destacam-se: a interrupção da nutrição enteral e dos medicamentos que dependem desse acesso. A passagem de outra sonda implica trauma e desconforto para o paciente, ocupa tempo do enfermeiro e aumenta os custos e a morbidade.

O uso de acessos enterais para a administração de medicamentos exige uma sistematização rigorosa a fim de se evitarem eventos adversos relacionados.

Orientações para a administração de medicamentos:

- O volume de água para irrigação das sondas depende do tipo de acesso enteral. Nos casos de sonda nasointestinal, gastrostomia e button, utilizar no mínimo 20 mL de água e, quando for sonda nasogastrojejunal ou gastrojejunosomia, um volume de 40 mL.
- Antes de administrar o medicamento, pausar a dieta enteral ou o que estiver sendo infundido, proceder irrigação adequada ao tipo de acesso e repetir a limpeza ao final da administração.
- Utilizar seringas de 20 mL de bico e pressão manual.
- Quando houver dois ou mais medicamentos a serem administrados por sonda no mesmo horário, triturar, diluir e infundir cada um separadamente. Nunca misturar ou administrar medicamentos concomitantemente no mesmo recipiente, evitando, dessa maneira, obstrução do acesso por precipitação, além de interação medicamentosa.
- Entre a administração de um medicamento e outro coincidentes no mesmo horário, irrigar a sonda com 10 mL de água ou 20mL quando for sonda nasogastrojejunal ou gastrojejunosomia. O volume de água poderá ser maior dependendo da viscosidade do medicamento (vide tabela).

- Os frascos de água administrados no decorrer do dia têm o objetivo de hidratar o paciente e não substituem a lavagem manual com seringa sob pressão.
- Utilizar trituradores de medicamentos de uso exclusivo para cada paciente e higienizar com água e sabão após triturar os medicamentos.
- Muitas preparações líquidas contêm sorbitol, o que confere mais viscosidade à fórmula. Esses xaropes devem ser diluídos conforme especificação na tabela de medicamentos (vide tabela).
- As cápsulas de gelatina que contêm líquidos, quando não houver alternativa, devem ser esvaziadas com ajuda de agulha e seringa de insulina e reconstituídas com água para evitar risco de obstrução da sonda (vide tabela).
- Cápsulas de gelatina dura (contendo pó) podem ser abertas e ter seu conteúdo dissolvido em água. Já as cápsulas que contêm grânulos não devem ser manipuladas. Preferencialmente, substituir por medicamento similar ou manipulado. Não se recomenda a técnica de coar com gaze (vide tabela).
- Comprimidos devem ser triturados até formar pó fino para diluição em água. Verificar se a trituração não compromete a eficácia e a estabilidade da substância ativa (vide tabela).
- Medicamentos com risco ocupacional não devem ser triturados. (vide tabela).

Acessos enterais para pacientes adultos

1. Sonda nasoenteral de localização gástrica (SNG) ou pós-pilórica (SNE)

É uma sonda longa (106 a 140 cm), geralmente confeccionada em silastic ou silicone. O diâmetro recomendado para adultos é de 10, 12 ou 15 French, a menos que haja algum

impedimento anatômico que requeira um acesso de calibre menor. A extremidade externa deve ter, preferencialmente, duas entradas separadas dispostas como um Y, uma para a infusão da dieta e outra para a lavagem da sonda e administração de medicamentos ou nutrientes à parte da dieta. A sonda nasoenteral é, em posição gástrica, o acesso mais utilizado.

2. Sonda nasogastrojejunal para alimentação enteral e drenagem gástrica simultânea (SNGJ)

É um acesso enteral confeccionado em material biocompatível, composto por uma sonda de calibre 16 ou 18 French cuja abertura interna deve estar localizada no estômago e por uma sonda nasoenteral, de calibre 8 French, cuja extremidade interna deve estar localizada em jejuno proximal, a 15 ou 20 cm do ângulo de Treitz. Dependendo do fabricante do acesso, a sonda nasoenteral pode estar soldada à sonda nasogástrica (preferível, pois confere mais segurança e estabilidade ao acesso) ou simplesmente passar por dentro dela, havendo então, o risco de ser tracionada inadvertidamente, perdendo sua posição jejunal.

Esse acesso possui três aberturas distintas e separadas: uma para drenagem gástrica, uma para infusão gástrica e outra para alimentação ou infusão de substâncias no jejuno.

3. Gastrostomia

São sondas de material biocompatível localizadas no estômago, através da parede abdominal, por meio de endoscopia digestiva alta ou cirurgia, ambas realizadas por profissional médico habilitado. O calibre indicado para um adulto varia de 16 a 24 French.

4. Jejunostomia (percutânea endoscópica ou cirúrgica)

São sondas de material biocompatível localizadas no jejuno, através da parede abdominal, por meio de endoscopia digestiva alta ou cirurgia, ambas realizadas por profissional médico habilitado. O calibre indicado para um adulto varia de 8 a 12 French.

5. Sonda de gastrojejunostomia

Acesso duplo, em material biocompatível, contando com uma sonda de gastrostomia de calibre 20 a 24 French, que se mantém aberta drenando o estômago e uma sonda mais longa e de calibre mais fino - 8 French, que é posicionada no jejuno. O posicionamento é endoscópico.

Recomenda-se que todos os acessos, sejam eles localizados por via manual, endoscópica ou cirúrgica, tenham sua posição confirmada por radiografia simples de abdômen antes de ser colocados em uso.

Como utilizar a tabela?

A tabela de medicamentos e recomendações de utilização via dispositivos enterais é composta por:

- Medicamento referência (marca comercial)
- Princípio ativo
- Forma farmacêutica
- Fabricante
- Trituração, diluição e administração
- Triturar? SIM / NÃO
- Dissolve sem trituração? SIM / NÃO
- Resíduo (capacidade de absorção, aderência ao dispositivo)
- Volume de água para diluir
- Observações gerais

A tabela está organizada por medicamentos em nome referência no mercado brasileiro e permite a busca pelo nome comercial do medicamento, por ordem alfabética. Identifica o princípio ativo e a forma farmacêutica respectiva.

Quando não houver a possibilidade de uso por via enteral, será sinalizado como **não recomendado**.

A coluna **RESÍDUO** é representada por cruzes (+ a ++++), sendo + a menor quantidade de resíduo e ++++ a maior quantidade. Medicamentos que geram mais resíduo geralmente requerem mais volume de água para diluição e uma homogeneização adequada, imediatamente antes da administração.

Deve-se observar o volume de água em mL necessário para diluição do medicamento de forma adequada.

Por último, as observações gerais poderão trazer dados específicos ou informações adicionais sobre o uso do medicamento. Para facilitar a utilização da tabela, é utilizado um código de cores:

Risco ocupacional

Medicamentos que oferecem risco para o manipulador por citotoxicidade e devem ser manipulados em condições adequadas

Não recomendado

Medicamentos cuja manipulação altera sua ação, oferecendo risco ao paciente

Utilizar apenas em condições especiais

Medicamentos habitualmente não recomendados mas que, em determinadas situações especiais, podem ser administrados desde que sejam tomados os cuidados necessários

Risco de obstrução de sonda

Medicamentos relacionados a obstrução de acesso enteral com grande frequência por suas características físico-químicas

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
AAS 100 mg	Ác. acetilsalicílico	Comprimido	Sanofi Aventis	-	SIM	SIM	+	15 mL	-
AAS 500 mg	Ác. acetilsalicílico	Comprimido	Sanofi Aventis	-	SIM	SIM	+	15 mL	-
Aciclovir 400 mg	Aciclovir	Comprimido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	15 mL	-
Actos 15 mg	Pioglitazona, cloridrato	Comprimido revestido	Abbott	Triturar, diluir e administrar imediatamente	Risco de obstrução de sonda pelo revestimento				-
Actos 30 mg	Pioglitazona, cloridrato	Comprimido revestido	Abbott	Triturar, diluir e administrar imediatamente	Risco de obstrução de sonda pelo revestimento				-
Adalat 10 mg	Nifedipina	Cápsula gelatinosa	Bayer	Romper a cápsula e dissolver debaixo da língua	Utilizar em condições especiais				-
Adalat Oros 30 mg	Nifedipina	Comprimido liberação	Bayer	Não recomendado. Os comprimidos de ação programada ou retardada não devem ser triturados. Preferir a opção sublingual	Risco de hipotensão arterial				-
Adalat Oros 60 mg	Nifedipina	Comprimido liberação	Bayer						
Adalat Retard 20 mg	Nifedipina	Comprimido revestido	Bayer	-	Risco de obstrução de sonda pelo revestimento				-
Ad-til	Acetato de retinol/ Colecalciferol (vitamina A + D)	Gotas	Nycomed Pharma	Formulação gotas	NÃO	SIM	-	20 mL	-
Aerolin 2mg cp	Salbutamol	Comprimido	Glaxo Wellcome	Utilizar a opção xarope	SIM	NÃO	-	15 mL	-
Aerolin 0,4 mg/mL	Salbutamol	Xarope	Glaxo Wellcome	Xarope	NÃO	SIM	-	15 mL de água para cada 10 mL de xarope	-
Agarol	Ágar-Ágar	Suspensão	Johnson & Johnson	Sugerir outra opção de laxante	NÃO	SIM	+++	100 mL de água para cada 10 mL da suspensão	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Akineton 2 mg	Biperideno, cloridrato	Comprimido	Abbott	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM (lento)	++	15 mL	-
Aldactone 100 mg	Espironolactona	Comprimido	Pfizer	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++++	20 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Aldactone 25 mg	Espironolactona	Comprimido	Pfizer	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Aldomet 250 mg	Metildopa	Comprimido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	20 mL	-
Aldomet 500 mg	Metildopa	Comprimido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	20 mL	-
Alivium 50 mg/mL	Ibuprofeno	Gotas	EMS	Gotas	NÃO	SIM	-	20 mL para cada 40 gotas	-
Alkeran 2 mg	Melfalan	Comprimido	GlaxoSmith Kline	Medicamento citostático	Risco ocupacional para o manipulador	-	-	-	-
Allegra 6 mg/mL	Fexofenadina, cloridrato	Suspensão pediátrica	Sanofi Aventis	-	SIM	SIM	+	15 mL	-
Allegra 120 mg	Fexofenadina, cloridrato	Comprimido revestido	Sanofi Aventis	Utilizar a opção suspensão pediátrica	SIM	SIM	+	15 mL	-
Allegra 60 mg	Fexofenadina, cloridrato	Comprimido revestido	Sanofi Aventis	Utilizar a opção suspensão pediátrica	SIM	SIM	+	15 mL	-
Amaryl 2 mg	Glimepirida	Comprimido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Aminofilina 100 mg	Aminofilina	Comprimido	Novartis	Utilizar a opção gotas	SIM	SIM (lento)	+++	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Aminofilina 240 mg/ml	Aminofilina	Gotas	Novartis	Gotas	NÃO	SIM	-	20 mL	
Amoxil 250 mg/5ml	Amoxicilina	Pó para suspensão oral	GlaxoSmith Kline	Utilizar a opção suspensão	NÃO	SIM	Viscoso	20 - 50 mL de água para cada 10 mL da suspensão (500 mg)	-
Amoxil 500 mg		Cápsula			SIM	SIM	++	30 - 40 mL	
Ampicilina 500 mg	Ampicilina	Comprimido	Eurofarma	-	SIM	NÃO	-	30 - 50 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Amplacilina 50 mg/mL	Ampicilina	Pó para Suspensão oral	Eurofarma	-	NÃO	SIM	-	30 - 50 mL para cada 10mL da suspensão reconstituída	-
Amplictil 25 mg	Clorpromazina	Comprimido	Sanofi Aventis	Utilizar a opção gotas	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Amplictil 4% (40 mg/mL)		Solução oral			NÃO	SIM	-	15 mL	
Anafranil 25 mg	Clomipramina	Drágea (sabor desagradável)	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Ancoron 200 mg/mL	Amiodarona, cloridrato	Gotas	Libbs	-	NÃO	SIM	-	20 mL de água para cada 6 gotas	-
Androcur 50 mg	Ciproterona, acetato	Comprimido	Schering-Plough	Medicamento cistostático	Risco ocupacional para o manipulador.				-
Antak 15 mg/mL	Ranitidina	Xarope	GlaxoSmith Kline	-	NÃO	SIM	-	30 - 40 mL de água para cada 10 mL do xarope	-
Apresolina 25 mg	Hidralazina, clorid.	Drágea	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Aprozide 300/12,5 mg	Irbesartana / Hidroclorotiazida	Comprimido revestido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	15 mL	-
Arcoxia 90 mg	Etoricoxibe	Comprimido revestido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	20 mL	-
Arimidex 1mg	Anastrozol	Comprimido	AstraZeneca	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Aropax 20 mg	Paroxetina	Drágea	GlaxoSmith Kline	Utilizar em condições especiais. Quando for necessário, triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	15 mL	-
Arovit 50.000 UI	Vitamina A	Drágea	Roche	Oferecer a opção injetável ou Ad-til gotas (vitamina A+ D3)	Não recomendado devido ao risco de obstrução de sonda				-
Asalit 400 mg	Mesalazina	Comprimido revestido	Merck Sharp & Dohme	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda pelo revestimento				-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Aspirina Prevent 100 mg	Ácido acetilsalicílico	Comprimido	bayer	Utilizar a opção comprimido simples (AAS)	Não recomendado para sonda em posição gástrica				-
Atenol 100 mg	Atenolol	Comprimido	AstraZeneca	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	15 mL	-
Atenol 50 mg					SIM	SIM	+++	15 mL	
Atlansil 200 mg	Amiodarona, cloridrato	Comprimido	SanofiAventis	Utilizar a opção gotas	SIM	SIM	++	10 - 20 mL	-
Avalox 400 mg	Moxifloxacina	Comprimido revestido	Bayer	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	20 - 30 mL	-
Avandia 4mg	Roziglitazona	Comprimido revestido	GlaxoSmith Kline	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	15 mL	-
Azitromicina diidratada 500 mg	Azitromicina diidratada	Comprimido revestido	Medley	Utilizar a opção suspensão	-	-	-	-	-
Azulfim 500 mg	Sulfasalazina	Comprimido revestido gastrorresistente	Apsen	-	Não recomendado para sonda em posição gástrica.				-
Bactrim F 800/160 mg	Trimetropina / Sulfametoxazol	Comprimido	Roche	Utilizar a opção suspensão	SIM	SIM	++++	20 mL	-
Bactrim 400/80 mg	Trimetropina / Sulfametoxazol	Comprimido	Roche	Utilizar a opção suspensão	SIM	SIM	++	20 mL	-
Bamifix 300 mg	Bamifilina	Drágea	Farmalab	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Beneroc	Complexo B	Drágea	Bayer	Utilizar a opção gotas	SIM	NÃO	+	20 mL	-
Beneroc Júnior	Complexo B	Gotas	Bayer		NÃO	SIM	-	20 mL	-
Bicarbonato de sódio 500 mg	Bicarbonato de sódio	Cápsula	Medicamento manipulado	Abrir a cápsula, diluir e administrar imediatamente. Pode ser utilizada também a opção pó (diluir e administrar imediatamente) ou a injetável 8,4%	Abrir a cápsula	NÃO	++	20 mL	-
Bicarbonato de sódio pó 3 mg	-	Pó	-	-	NÃO	SIM	-	20 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Binelli gotas 20 mg/mL	Fedrilato	Gotas	Daudt	-	NÃO	SIM	-	15 mL	-
Binotal 500 mg	Ampicilina	Comprimido	Eurofarma	-	SIM	NÃO	-	30 - 50 mL	-
Biovir 150/300 mg	Lamivudina/ Zidovudina	Comprimido	GlaxoSmith Kline	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	20 mL	-
Bricanyl 0,3 mg/mL	Terbutalina, sulfato	Xarope	AstraZeneca	-	NÃO	SIM	-	15 mL	-
Bufedil 150 mg	Buflomedil	Comprimido revestido	Abbott	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Bufferin 500 mg	Ácido acetilsalicílico	Ác. acetilsalicílico	Novartis	Utilizar a opção comprimido simples (AAS)	Não recomendado para sonda em posição gástrica.				-
Burinax 1 mg	Bumetanida	Comprimido	Solvay	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Buscopan composto 10/250 mg	Escopolamina/ Dipirona	Drágea	Boehringer Ingelheim	Utilizar a opção gotas	SIM	SIM (lento)	++	20 - 40 mL	-
Buscopan composto gotas	Escopolamina/ Dipirona	Gotas	Boehringer Ingelheim	-	-	SIM	-	15 mL	-
Buscopan simples 10 mg	Escopolamina, butilbrometo	Drágea	Boehringer Ingelheim	Utilizar a opção gotas	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Buscopan 10 mg/mL		Gotas			-	SIM	-	15 mL	-
Calcium Sandoz 500 mg "F"	Carbonato de cálcio / Lactogliconato de cálcio	Comprimido efervescente	Novartis	Diluir o comprimido e administrar ao término da efervescência	NÃO	SIM (lento)	-	50 - 100 mL	-
Calcort 30 mg	Deflazacort	Comprimido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	15 mL	-
Calcort 6 mg				-	SIM	SIM	+	15 mL	-
Calsan 500 mg	Carbonato de cálcio	Comprimido mastigável	Novartis	Substituir por Calcium Sandoz FF (diluir e administrar ao término da efervescência)	SIM	SIM (muito lento)	+	20 - 30 mL	-
Captopril 12,5 mg	Captopril	Comprimido	Medley	Triturar, diluir e administrar imediatamente . Pode-se optar pela via sublingual	SIM	SIM (muito lento)	+	20 - 30 mL	-
Captopril 25 mg			EMS		SIM	SIM (muito lento)	++	20 - 30 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Captopril 12,5 mg	Captopril	Comprimido	Medley	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Pode-se optar pela via sublingual	SIM	SIM (muito lento)	+	20 - 30 mL	-
Captopril 25 mg			EMS		SIM	SIM (muito lento)	++	20 - 30 mL	-
Carbolitium 300 mg	Carbonato de Lítio	Comprimido	Eurofarma	-	SIM	SIM (muito lento)	++++	10 - 20 mL	-
Cardizem 30 mg	Diltiazem, cloridrato	Comprimido	Boehringer Ingelheim	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Cardizem 60 mg					SIM	NÃO	+++	15 mL	
Carduram XL 4 mg	Mesilato de doxazosina	Comprimido de liberação prolongada	Pfizer	Não recomendado	Risco de hipotensão arterial				-
Cataflam 50 mg	Diclofenaco potássico	Drágea	Novartis	Utilizar a opção gotas devido à alta viscosidade. Diluir com volume adicional de água.	SIM	NÃO	++++	20 mL	-
Cataflam 15 mg/mL	Diclofenaco potássico	Gotas	Novartis		NÃO	SIM	Muito viscoso	100 mL de água para cada 10 gotas	-
Ceclor 250 mg/5mL	Cefaclor	Suspensão	Sigma Pharma	-	NÃO	SIM	++++	30 - 50 mL de água para cada 10 mL suspensão (500 mg)	-
Cefaclor 500 mg	Cefaclor	Cápsula	Germed	Utilizar a opção suspensão	NÃO	Abrir a cápsula	++++	20 mL	
Cedur 200 mg	Bezafibrato	Comprimido revestido	Roche	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-
Cefadroxila 250 mg/5 mL	Cefadroxila monoidratada	Suspensão	EMS	Utilizar a opção suspensão	NÃO	SIM	+++	30 - 50 mL água para cada 10 mL suspensão 500mg	-
Cefamox 500 mg		Cápsula	Bristol-Myers Squibb		NÃO	Abrir a cápsula	+++	15 mL	
Celebra 100 mg	Celecoxib	Cápsula	Pfizer	-	NÃO	Abrir a cápsula	+	15 mL	-
Cellcept 500 mg	Micofenolato de mofetila	Comprimido revestido	Roche	Medicamento citostático	Risco ocupacional para o manipulador				-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Centrum	Polivitamínico/ Poliminerais	Comprimido	Wyeth	Utilizar um polivitamínico líquido	Risco de obstrução de sonda				-
Cewin 500 mg	Ácido ascórbico (vitamina C)	Comprimido de desintegração lenta	Sanofi Aventis	Utilizar a opção gotas	Não recomendado				-
Cipramil 20 mg	Citalopram	Comprimido	Lundbeck	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Cipro 500 mg	Ciprofloxacino	Comprimido revestido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	NÃO	SIM	+++	20 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Citalor 10 mg	Atorvastatina cálcica	Comprimido revestido	Pfizer	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Citoneurim 500 UI	Tiamina/Piridoxina/ Cianocobalamina	Drágea	Merck Sharp & Dohme	Utilizar a opção injetável	Risco de obstrução de sonda				-
Claritin 10 mg	Loratadina	Comprimido	Schering-Plough	Utilizar a opção xarope	SIM	SIM	++	15 mL	-
Claritin 1mg/mL	Loratadina	Xarope	Schering-Plough	Utilizar a opção xarope	NÃO	SIM	-	20 mL	-
Claritromicina 250 mg	Claritromicina	Comprimido revestido	Medley	-	SIM	SIM	++++	20 mL (água morna)	-
Claritromicina 500 mg	Claritromicina	Comprimido revestido	Schering-Plough	-	SIM	SIM	+	20 - 30 mL (água morna)	-
Claritromicina 250 mg/5 mL	Claritromicina	Suspensão pediátrica	EMS	Devido à sua viscosidade preferir a opção, comprimido	NÃO	SIM	++++ Viscoso	-	-
Clavulin 125/ 31,25 mg/5 mL	Amoxicilina/ Clavulanato	Suspensão	GlaxoSmith Kline	Utilizar a opção suspensão	NÃO	SIM	Viscoso	20 mL de água para cada 10 mL da suspensão	-
Clavulin 500/125 mg	Amoxicilina/ Clavulanato	Comprimido revestido	GlaxoSmith Kline	Utilizar a opção suspensão	Difícil	SIM (lento)	+	20 - 30 mL	-
Clorana 50 mg	Hidroclorotiazida	Comprimido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Clotássio 900mg/ 15mL 100mL	Cloreto de potássio	Xarope	Bunker	-	NÃO	SIM	-	1 mL de água para cada 1 mL de xarope	-
Clusivol composto	Polivitamínico/poliminerais	Xarope	Wyeth	Sugerir outra opção de polivitamínico/poliminerais	Risco de obstrução de sonda				Alta viscosidade
Colchis 0,5 mg	Colchicina	Comprimido	Apsen	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Combiron	Glicinato férrico + associações	Suspensão oral	Aché	-	NÃO	SIM	Viscoso	30 mL	-
Complexo B	Complexo B	Comprimidos revestido	EMS	Utilizar a opção gotas	Risco de obstrução de sonda				-
Contam	Entacapon	Comprimido	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15mL	-
Coumadin 1 mg	Varfarina	Comprimido	Bristol-Myers Squibb	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Coumadin 2,5 mg					SIM	NÃO	++	15 mL	
Coumadin 5 mg	Varfarina	Comprimido	Bristol-Myers Squibb	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Cozaar 50 mg	Losartan potássico	Comprimidos revestido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	
Creon 25000 UI	Pancreatina	Cápsula minimicroesferas com revestimento ácido-resistente	Solvay Pharma	Abrir a cápsula, não triturar e dispersar os grânulos em 15 mL de água	NÃO	SIM	+	15mL	-
Crestor 10 mg	Rosuvastatina cálcica	Comprimido revestido	AstraZeneca	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Crixivam 400 mg	Indinavir, sulfato	Cápsula	Merck Sharp & Dohme	Abrir a cápsula, diluir e administrar imediatamente	Abrir a cápsula	NÃO	+	20 mL	-
Cronomet 200/50 mg	Carbidopa/levodopa	Comprimido de liberação controlada	Merck Sharp & Dohme	Para que as propriedades de liberação controlada do produto sejam mantidas, os comprimidos não devem ser triturados	Não recomendado				-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Cymbalta 30 mg	Duloxetina, clorid.	Cápsula	Eli Lilly	Não recomendado	Não recomendado				-
Cymbalta 60 mg									
Daforin 20 mg/mL	Fluoxetina	Gotas	Sigma Pharma	-	NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 1 mL ou 20 gotas	-
Dalacin 300 mg	Clindamicina, cloridrato	Cápsula	Pfizer	Após abertura da cápsula, administrar imediatamente	Abrir a cápsula	NÃO	++	15 mL	-
Dalmadorn 30 mg	Flurazepam	Comprimido revestido	Valeant	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	10 - 20 mL	-
Daonil 5 mg	Glibenclamida	Comprimido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	15 mL	-
Daraprim 25 mg	Pirimetamina	Comprimido	Farmoquímica	-	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Decadron 0,5 mg	Dexametasona	Comprimido	Aché	Utilizar a opção elixir	SIM	SIM	+++	15 mL	-
Decadron 0,75 mg					SIM	SIM	+++	15 mL	
Decadron 4 mg		Elixir			SIM	SIM	+++	15 mL	
Decadron 0,1 mg/mL					NÃO	SIM	-	15 mL	
Depakene 250 mg/5mL	Ácido valproico / Valproato de sódio	Xarope	Abbott	Utilizar a opção xarope. Devido à sua alta osmolalidade, recomenda-se diluir com volume de água adicional	NÃO	SIM	Viscoso	50 mL	-
Depakene 500 mg		Comprimido revestido			SIM	NÃO	+++	20 mL	
Depakote ER 500 mg	Divalproato de sódio	Comprimido revestido de liberação prolongada	Abbott	Não recomendado. Sugerir a opção de comprimido simples ou valproato de sódio (Depakene)	Não recomendado				Risco de alteração farmacocinética levando a flutuação do nível sérico do medicamento
Depakote Sprinkle 125 mg		Cápsula de liberação lenta							

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Diamcron MR 30 mg	Clorpropamina	Comprimido	Pfizer	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++++	20 mL	-
Diamox 250 mg	Gliclazida	Comprimido liberação de modificada	Servier	Não recomendado	Risco de alterações glicêmicas ao paciente				-
Diazeftast 5 mg	Acetazolamida	Comprimido	GENOM União Química	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	15 mL	-
Diempax 5 mg	Diazepam	Comprimido sublingual	Sanofi Aventis	Dissolver debaixo da língua	Apresentação sublingual				-
Digesan 10 mg	Diazepam	Comprimido	Sanofi Aventis	Existe a opção sublingual Diazeftast	SIM	SIM (lento)	+ / ++	15 mL	-
Digesan 4 mg/mL	Bromoprida	Cápsula	Sanofi Aventis	Utilizar a opção gotas	Abrir a cápsula	NÃO	-	15 mL	-
Digoxina 0,05 mg/mL		Gotas			NÃO	SIM	-	10 mL para cada 30 gotas	
Digoxina 0,25 mg	Digoxina	Elixir	GlaxoSmith Kline	Utilizar a opção elixir	NÃO	SIM	+	1 mL de água para cada 1 mL de elixir	-
Dilacoron 80 mg		Comprimido			SIM	SIM	+	15 mL	
Dimorf 10 mg/mL	Verapamil, cloridrato	Comprimido revestido	Abbott	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Dimorf 10 mg	Morfina	Solução oral	Cristália	Utilizar a opção solução oral. O comprimidos simples podem ser triturados, diluídos e administrados imediatamente	NÃO	SIM	-	10 - 20 mL	-
Dimorf 30 mg	Morfina	Comprimido		Não recomendado. Utilizar a opção solução oral	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Dimorf LC 30 mg					SIM	NÃO	++++	20 mL	
Dimorf LC 60 mg	Morfina	Cápsulas com microgrânulos de liberação cronogramada	Cristália	Não recomendado. Utilizar a opção solução oral	Risco de alterações farmacocinéticas e depressão respiratória ao paciente				-
Dimorf LC 100 mg									
Dimorf LC 100 mg									

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Diovan 80 mg	Valsartan	Comprimido	Novartis	-	SIM	SIM	++	15 mL	-
Divelol 12,5 mg	Carvedilol	Comprimido	Baldacci	Triturar, diluir em meio ácido e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	15 mL	-
Divelol 3,125 mg					SIM	SIM	+	15 mL	
Dividol 70 mg	Hidroxibenzoato de viminol	Cápsula	Zambon	-	SIM	NÃO	++++	30 mL	-
Dorflex 35 mg / 300 mg / 50 mg	Citrato de orfenadrina/ Dipirona sódica/ Cafeína anidra	Comprimido	Sanofi Aventis	Utilizar a opção solução oral	SIM	NÃO	+	20 mL	-
Dorflex gotas 35 mg / 300 mg / 50 mg/mL		Gotas			SIM	NÃO	+	20 mL	
Dormonid 15 mg	Midazolam, maleato	Comprimido revestido	Roche	Utilizar a opção solução oral	SIM	SIM	+++	15 mL	-
Dormire 2 mg/mL		Solução	Cristália		NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 10 gotas	
Dramin 100 mg	Dimenidrato	Comprimido	Nycomed Pharma	Utilizar a opção gotas	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Dramin gotas		Gotas			NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 1 mL ou 20 gotas	
Dramin B6	Dimenidrato/ cloridrato de piridoxina	Comprimido revestido	Nycomed Pharma	Utilizar a opção gotas	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Dramin B6 Gts	Dimenidrato/ cloridrato de piridoxina	Gotas			NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 1 mL ou 20 gotas	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Dulcolax 5 mg	Bisacodil	Drágea	Boehringer Ingelheim	Não recomendado. Sugerir a opção Guttalax. Dulcolax é resistente ao suco gástrico e ao entérico para ser liberado apenas no cólon, portanto perde sua característica quando administrado por sonda (triturado e dissolvido)	SIM	NÃO	+	15 mL	Redução significativa da biodisponibilidade e eficácia quando administrado com nutrição enteral
Ebix 10 mg	Memantina, clorid	Comprimido revestido	Lundbeck	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	-	15 mL	-
Efexor XR 37,5 mg	Venlafaxina	Cápsula de liberação controlada	Wyeth	Não recomendado. Sugerir a opção não padrão em comprimido (Biossinética) ou manipulação (nesse caso, reavaliar a dose e posologia)	Risco de alteração farmacocinética levando a flutuação do nível sérico				Risco de obstrução de sonda
Efexor XR 75 mg									
Emend 125/80 mg	Aprepitante	Cápsula	Merck		NÃO	SIM	++	20 mL	-
Endofolin 5 mg	Ácido fólico	Comprimido revestido	Marjan Farma	Utilizar a opção gotas	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Endofolin 0,2 mg/mL		Gotas			NÃO	SIM	Viscoso	10 mL de água para cada 1 mL ou 20 gotas	
Ephynal 400 mg	Acetato de racealfatocoferol (vitamina E)	Cápsula gelatinosa	Bayer	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-
Epivir	Lamivudina	Comprimido	GlaxoSmith Kline	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	20 mL	-
Eranz 5 mg	Donepezila, cloridrato	Comprimido revestido	Wyeth	Triturar, diluir e administrar imediatamente	NÃO	SIM (lento)	+	15 mL	-
Eritrex 500 mg	Estolato de eritromicina	Comprimido	Aché	Utilizar a opção suspensão (Ilosone). Devido a sua alta osmolaridade e viscosidade diluir com volume adicional, em água	SIM	NÃO	+++	30 mL	-
Etambutol 400 mg	Etambutol	Comprimido	Posto de saúde do SUS	Existe a opção suspensão. Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	20 mL	-
Eulexin 250 mg	Flutamida	Comprimido	Schering-Plough	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM (lento)	+++	20 - 50 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Ezetrol 10 mg	Ezetimiba	Comprimido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Feldene SL 20 mg	Piroxican	Comprimido sublingual	Pfizer	Utilizar sublingual. Não é recomendável a trituração de medicamentos de ação imediata	Não recomendado				-
Feldene dispersível 20 mg		Comprimido dispersível			NÃO	SIM	-	20 mL	
Femigestrol	Acetato de megesterol	Comprimido	Bergamo	Medicamento citostático	Risco ocupacional para o manipulador				-
Fenergan 25 mg	Prometazina	Comprimido	Sanofi Aventis	Utilizar a opção xarope	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Fenergan xarope		Xarope			NÃO	SIM	-	20 mL de água para cada 5 mL de xarope	
Flagyl 40 mg/mL	Metronidazol	Suspensão pediátrica	Sanofi Aventis	-	NÃO	SIM	+	20 mL de água para cada 10 mL da suspensão	-
Flagyl 400 mg	Metronidazol	Comprimido revestido	Sanofi Aventis	Utilizar a opção suspensão	Risco de obstrução de sonda				-
Floratil 200 m/g env.	<i>Saccharomyces boulardii</i> 17 liofilizado	Pó para solução oral	Merck Sharp & Dohme	As cápsulas de Floratil podem ser abertas	SIM	SIM	-	20 mL de água para cada sachê	-
Floratil 100 mg		Cápsula			Abrir a cápsula	NÃO	++	10 - 20 mL	
Florinef 0,1 mg	Fludrocortizona	Comprimido	Bristol-Myers Squibb	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	NÃO	15 mL	-
Floxacin 400 mg	Norfloxacino	Comprimido revestido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Fluimucil 200 mg Fluimucil 600 mg D	N-acetilcisteína	Pó para solução oral	Zambon	-	NÃO	SIM	-	50 - 100 mL	-
Fosamax 10 mg	Alendronato de cálcio	Comprimido	Merck Sharp & Dohme	-	SIM	SIM	+++	15 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Foslamer 800 mg	Sevelamer	Comprimido	EMS	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda.				-
Frontal 0,5 mg	Alprazolam	Comprimido	Pfizer	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Furosemida 1 mg/mL	Furosemida	Suspensão	Manipulado		NÃO	SIM	Viscoso	30 mL	-
Galvus 50 mg	Vildagliptina	Comprimido	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Gardenal 4% gotas ped.	Fenobarbital	Gotas	Sanofi Aventis	Preferir a solução pediátrica. Diluir em água sem triturar e administrar imediatamente	NÃO	SIM	-	20 - 30 mL	-
Gardenal 100 mg		Comprimido			SIM	SIM	++	10 - 20 mL	
Gardenal 50 mg					SIM	SIM	++	15 mL	
Genuxal 50 mg	Ciclofosfamida	Comprimido	Baxter	Medicamento citostático	Risco ocupacional ao manipulador				-
Glifage XR 500 mg	Metformina	Comprimido revestido de ação prolongada	Merck Sharp & Dohme	Utilizar a opção que não seja XR	Risco de alteração farmacocinética levando a flutuação do nível sérico				-
Glifage XR 750 mg									
Glifage 500 mg	Metformina	Comprimido revestido	-	-	SIM	NÃO	++	20 mL	-
Glifage 850 mg				-	SIM	NÃO	++	20 mL	-
Glivec 400 mg	Imatinibe	Comprimido revestido	Novartis	Medicamento citostático	Risco ocupacional ao manipulador				-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Hixizine 25 mg	Cetirizina	Comprimido	Theraskin	Utilizar a opção xarope	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Hixizine 2 mg/mL					NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 5 mL de xarope	
Humectol D 60 mg / 5 mg	Docusato sódico/ Bisacodil	Comprimido revestido	DM Hypermarcas	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Hydergine 4,5 mg	Codergotrina	Comprimido	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Hydrea 500 mg	Hidroxiureia	Comprimido	Bristol-Myers Squibb	Medicamento citostático	Risco ocupacional ao manipulador				-
Hyzaar 50/12,5 mg	Losartana potássica /Hidroclorotiazida	Comprimido revestido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	-	15 mL	-
Ilosone 250 mg / 5 mL	Estolato de eritromicina	Suspensão	Valeant	Utilizar a opção suspensão (Ilosone). Devido a sua alta osmolaridade e viscosidade, diluir com volume adicional em água	NÃO	SIM	Viscoso	50 - 100 mL de água para cada 10 mL da suspensão	-
Imovane 7,5 mg	Zopiclone	Comprimido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM (lento)	++++	20 mL	-
Imuran 50 mg	Azatioprina	Comprimido	GlaxoSmith Kline	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	-	15 mL	-
Inderal 10 mg	Propranolol, cloridrato	Comprimido	AstraZeneca	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Indinavir 400 mg	Indinavir	Cápsula	Posto de saúde de SUS	Diluir e administrar imediatamente	Abrir a cápsula	SIM	+	15 mL	-
Indocid 50 mg	Indometacina	Cápsula	Merck Sharp & Dohme	Diluir e administrar imediatamente	Abrir a cápsula	NÃO	++	15 mL	-
Infectrim 400/80 mg (10 mL)	Trimetropina/ Sulfametoxazol	Suspensão oral	Boehringer Ingelheim	Utilizar a opção suspensão	NÃO	SIM	- Viscoso	50 - 60 mL de água para cada 20 mL de suspensão reconstituída	-
Isordil 5 mg	Dinitrato de isossorbida	Comprimido sublingual	Sigma Pharma	-	SIM	NÃO	+	10 mL	Usar via sonda em pacientes com diminuição do nível de consciência ou disfagia
Isocord 20 mg	Dinitrato de isossorbida	Cápsula	Evolabis	Não recomendado. Sugerir a opção sublingual (Isordil)	Risco de obstrução de sonda				-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Isocord 40 mg	Dinitrato de isossorbida	Cápsula	Evolabis	Não recomendado. Sugerir a opção sublingual (Isordil)	Risco de obstrução de sonda				-
Isoniazida + Rifampicina	Isoniazida + Rifampicina	Cápsula	Posto de saúde do SUS	Preferir as opções individuais	SIM	SIM (lento)	+++	20 - 30 mL	-
Isoniazida 100 mg	Isoniazida	Comprimido	Posto de saúde do SUS	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	10 - 20 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Januvia 50 mg	Sitagliptina, fosfato	Comprimido revestido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	-	20 mL	-
Jumexil 5 mg	Selegilina	Comprimido	Farmalab	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Jurnista 8 mg	Hidromorfona	Comprimido de liberação prolongada	Janssen–Cilag	Não recomendado	Risco de alteração farmacocinética que pode levar a depressão respiratória				-
Kaletra 200/50 mg	Lopinavir / Ritonavir	Comprimido	Posto de saúde do SUS	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	-	20 mL	-
Keflex 250 mg/5 mL	Cefalexina	Suspensão	Bagó	Devido à sua viscosidade, preferir a opção comprimido	NÃO	SIM	++++	20 - 50 mL de água para cada 10 mL da suspensão (500 mg)	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Keflex 500 mg		Drágea			SIM	SIM	+	20 mL	
Kytril 1mg	Granisetrona	Comprimido	Roche	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Label 15 mg/mL	Ranitidina	Xarope	Aché	-	NÃO	SIM	-	30 - 40 mL de água para cada 10 mL do xarope	-
Lactulona	Lactulose	Xarope	Daiichi Sankyo	Xarope	NÃO	SIM	-	20 mL	Evitar administrar quantidades elevadas de lactulona, pois pode produzir diarreia e diminuir a absorção dos nutrientes da nutrição enteral

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Lamictal 25 mg	Lamotrigina	Comprimido	GlaxoSmith Kline	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	15 mL	-
Lamictal 50 mg					SIM	SIM	+++	15 mL	-
Lanvis 40 mg	Tioguanina	Comprimido	GlaxoSmith Kline	Medicamento citostático	Risco ocupacional para o manipulador				-
Lasix 40 mg	Furosemida	Comprimido	Sanofi Aventis	Preferir a opção suspensão	SIM	SIM	+	15 mL	Suspensão pode ser manipulada 1 mg/mL
Laxol	Óleo de ricino	Solução	Daudt	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-
Leite de magnésia Philips	Hidróxido de magnésio	Suspensão	GlaxoSmith Kline	Suspensão	NÃO	SIM	-	20 - 30 mL para cada 10 mL da suspensão	Pode retardar o esvaziamento gástrico e diminuir a motilidade gastrointestinal
Levaquin 500 mg	Levofloxacino	Comprimido revestido	Janssen–Cilag	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Lexapro 10 mg	Escitalopram, oxalato	Comprimido revestido	Lundbeck	Utilizar a opção gotas	SIM	SIM	++	15 mL	-
Lexapro 10 mg/mL		Gotas			NÃO	SIM	++	15 mL	
Lexotan 2,5 mg/mL	Bromazepam	Gotas	Roche	Utilizar a opção gotas	NÃO	SIM	-	15 mL	-
Lexotan 3 mg		Comprimido			SIM	SIM	+++	15 mL	
Liberan 10 mg	Cloreto de betanecol	Comprimido	Apsen	-	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Lioresal 10 mg	Baclofeno	Comprimido	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Lipitor 10 mg	Atorvastatina cálcica	Comprimido	Pfizer	Quando for necessário, triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Lisador	Dipirona/ Prometazina/ Adifenina	Comprimido	Farmasa	Utilizar a opção gotas	SIM	NÃO	++	20 mL	-
Lisador		Gotas			NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 30 gotas	
Litocit 5 mEq	Citrato de potássio	Comprimido de absorção retardada	Apsen	Não recomendado	NÃO	Não recomendado			-
Livial 2,5 mg	Tibolona	Comprimido	Organon		SIM	SIM	+	15 mL	-
Lorax 1 mg	Lorazepan	Comprimido	Wyeth	Diluir sem triturar e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Losec Mups 20 mg	Omeprazol/ Magnésio	Comprimido revestido	AstraZeneca	Diluir e administrar imediatamente	NÃO	SIM	+++	20 mL	-
Ludiomil 25 mg	Maprotilina, cloridrato	Comprimido revestido	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Luftal 40 mg	Dimeticona	Comprimido	Bristol-Myers Squibb	Utilizar a opção gotas	SIM	NÃO	+++	20 mL	-
Luftal 75 mg/mL		Gotas			NÃO	SIM	+	20 mL	
Lyrica 75 mg	Pregabalina	Cápsula	Pfizer	-	SIM	NÃO		15 mL	-
Maalox Plus	Hidróx. alumínio/ Hidróx. magnésio/ Dimeticona	Suspensão	Sanofi Aventis	Suspensão	NÃO	SIM	-	20 mL de água para cada 10 mL da suspensão	-
Mylanta Plus	Hidróx. alumínio/ Hidróx. magnésio/ Dimeticona	Suspensão	Pfizer	Suspensão	NÃO	SIM	-	20 mL de água para cada 10 mL da suspensão	-
Macrofantina 100 mg	Nitrofurantoína	Cápsula	Schering-Plough	Utilizar a opção suspensão	Abrir a cápsula	NÃO	+++	20 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Marevan 5 mg	Varfarina	Comprimido	Farmoquímica	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Maxalt 10 mg	Benzoato de rizatriptano	Comprimido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	-	15 mL	-
Mebendazol 20 mg/mL	Mebendazol	Suspensão	EMS	-	NÃO	SIM	-	15 mL	-
Megestat 160 mg	Megestrol, acetato	Comprimido	Bristol-Myers Squibb	-	SIM	SIM	-	20 mL	-
Melleril 50 mg	Tioridazina	Drágea	Novartis	Utilizar a opção solução oral	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Melleril 3% (30 mg/mL)		Solução oral	Novartis		NÃO	SIM	-	20 mL de água para cada 4 mL da solução oral	
Mesacol 400 mg	Mesalazina	Comprimido revestido	Merck Sharp & Dohme	-	Risco de obstrução de sonda pelo revestimento				-
Mestinon 60 mg	Brometo de piridostigmina	Comprimido	Valeant	-	SIM	SIM	+++	20 mL	-
Metamucil	<i>Psyllium Plantago</i>	Pó para solução oral	Procter & Gamble	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-
Methergin 0,125 mg	Metilergometrina, maleato	Drágea	Novartis	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-
Meticorten 5 mg	Prednisona	Comprimido	Schering-Plough	Diluir, dissolver e administrar imediatamente. Tentar substituir por um equivalente terapêutico (Ex. Predsin = Prednisolona 3 mg/mL)	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Meticorten 20 mg					SIM	NÃO	+++	15 mL	
Micostatin 100000 UI/mL	Micostatin	Suspensão oral	Bristol-Myers Squibb	-	NÃO	SIM	-	20 mL de água para cada 5 mL da suspensão	-
Minipress SR 1 mg	Prazosina, cloridrato	Cápsula de liberação lenta	Pfizer	Não recomendado	Risco de alteração farmacocinética que pode levar a hipotensão arterial				-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Miosan 10 mg	Ciclobenzaprina, cloridrato	Comprimido revestido	Apsen	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	20 mL	-
MM Expectorante	Potássio/Iodeto / <i>Lobelia Inflata</i> / <i>Hyoscyamus niger</i>	Xarope	Farmasa	-	NÃO	SIM	Viscoso	30 mL para cada 10 mL da suspensão	-
Moduretic 50/5 mg	Hidroclorotiazida/ Cloridrato de amilorida	Comprimido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente (pode irritante se não for bem diluído)	SIM	SIM	+++	15 mL	-
Monocordil 40 mg	Mononitrato de isossorbida	Comprimido	Baldacci	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	15 mL	-
Motilium 10 mg	Domperidona	Comprimido	Janssen- Cilag	Utilizar a opção suspensão	SIM	NÃO	+	15 mL	Favorece o esvaziamento gástrico e estimula a motilidade intestinal, podendo originar diarreia
Motilium 1 mg/mL		Suspensão oral			NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 10 mL da suspensão	
Mucofan Adulto	Carbocisteína	Xarope	União Química	-	NÃO	SIM	Viscoso	30 mL de água para cada 10 mL de xarope	-
Mucosolvam 50 mg/mL Adulto	Ambroxol	Xarope	Boehringer Ingelheim	-	NÃO	SIM	Viscoso	30 mL de água para cada 10 mL de xarope	-
Myfortic 360 mg	Micofenolato de sódio	Comprimido revestido	Novartis	Medicamento cistostático	Risco ocupacional para o manipulador				-
Myleran 2 mg	Bussulfano	Comprimido revestido	Glaxo Wellcome	Medicamento cistostático	Risco ocupacional para o manipulador				-
Mytedon 10 mg	Metadona, cloridrato	Comprimido	Cristália	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Mytedon 5 mg					SIM	SIM (lento)	++	15 mL	
Naprosyn 250 mg	Naproxeno	Comprimido	Roche	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	20 mL	-
Naramig 2,5 mg	Naratriptana	Comprimido	GlaxoSmith Kline	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	20 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Naturetti	Sena/Tamarindo/Alcaçuz	Cápsula	Sanofi Aventis	Não recomendado. Oferecer a opção Tamarine geleia	Risco de obstrução de sonda				-
Neomicina 500 mg	Neomicina	Cápsula	Manipulado Drogaméria	Abrir a cápsula e administrar imediatamente	Abrir a cápsula	NÃO	-	20 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Neosaldina	Isomepteno/ Dipirona/Cafeína	Drágea	Abbott	Utilizar a opção solução	SIM	NÃO	-	30 mL	-
Neosaldina		Solução oral			NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 40 gotas	
Neozine 40 mg/mL	Levomepromazina	Gotas	Sanofi Aventis	-	NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 40 gotas	-
Neuleptil 4%	Periciazina	Gotas	Sanofi Aventis	-	NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 40 gotas	-
Neurontin 300 mg	Gabapentina	Cápsula	Pfizer	Abrir a cápsula e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Nexium 40 mg	Esomeprazol magnésio	Comprimido revestido	AstraZeneca	-	NÃO	SIM	+++	20 mL	-
Niar 5 mg	Selegilina, cloridrato	Comprimido	Abbott	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	20 mL	-
Nisulid 50 mg/ml	Nimesulida	Solução oral	Aché	Utilizar a opção gotas ou solução	NÃO	SIM	-	10 - 20 mL de água para cada 1 mL ou 20 gotas	-
Nisulid 100 mg/ml		Suspensão			NÃO	SIM	-	50 mL de água para cada 10 mL da suspensão	
Nisulid 100 mg		Comprimido			SIM	SIM	-	15 mL	

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Nizoral 200 mg	Cetoconazol	Comprimido	Janssen–Cilag	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	20 mL	-
Nolvadex 10 mg	Tamoxifeno, citrato	Comprimido revestido	AstraZeneca	Medicamento citostático	Risco ocupacional para o manipulador				-
Noripurum 100 mg	Hidróxido de ferro III	Comprimido mastigável	Nycomed Pharma	Utilizar a opção solução oral ou xarope	SIM	NÃO	+++	20 a 50 mL	-
Noripurum fólico		Comprimido mastigável			SIM		++	20 mL	
Noripurum 50 mg/20 gotas	Hidróxido de ferro III	Solução oral	Nycomed Pharma	Utilizar a opção solução oral ou xarope	NÃO	SIM	-	10 - 20 mL para cada 20 gotas da solução oral	-
Noripurum 100 mg/ 10 mL		Xarope			NÃO	SIM	-	10 - 20 mL de água para cada 10 mL de xarope	
Novalgina 500 mg	Dipirona sódica	Comprimido	Sanofi Aventis	Utilizar a opção gotas ou solução	SIM	NÃO	-	15 mL	-
Novalgina 500 mg/mL		Gotas			NÃO	SIM	-	10 - 20 mL água para cada 20 gotas da solução oral	
Novalgina 50 mg/mL		Solução			NÃO	SIM	-	15 ml de água para cada 5 mL da solução	
Novamox 400/ 57 mg /5 mL	Amoxicilina/ Clavulanato	Suspensão	Aché	Utilizar a opção suspensão	NÃO	SIM	Viscoso	30 - 50 mL de água para cada 10 mL da suspensão	-
Nujol	Óleo mineral	Solução	Schering–Plough	Não recomendado	Caso necessário, utilizar diluído com 100 mL de água				Risco de obstrução de sonda
Olcadil 1 mg	Clozazolam	Comprimido	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	-	15 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Omeprazol 20 mg	Omeprazol	Cápsula	Medley/ Biossintética	Não recomendado. Utilizar a opção Omeprazol Mups	Não recomendado				-
Ormigrein	Ergotamina/ Paracetamol/ Atropina	Comprimido	Organon	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Os-Cal D 500 mg	Carbonato de cálcio / vitamina D	Comprimido revestido	Sanofi Aventis	Não recomendado. Preferir outra formulação ou sugerir as opções: carbonato de cálcio efervescente + colecalciferol gotas	Risco de obstrução de sonda.				-
Oxigen 30 mg	Nimodipino	Comprimido revestido	Biossintética	Pode ser triturado e administrado imediatamente	SIM	SIM (lento)	+	20 mL	-
Oxycontin 10 mg	Oxicodona	Comprimido de liberação controlada	Zodiac	Não recomendado	Risco de alteração farmacocinética que pode levar a depressão respiratória				-
Oxycontin 20 mg									
Pamelor 10 mg	Nortriptilina, cloridrato	Cápsula	Novartis	Utilizar a opção suspensão	Abrir a cápsula	SIM	++	15 mL	-
Pamelor 2 mg/mL		Suspensão						10 mL	-
Pantelmin 500 mg	Mebendazol	Comprimido	Janssen-Cilag	Preferir suspensão (Mebendazol)	SIM	SIM	+++	20 mL	-
Pantozol 40 mg	Pantoprazol sódico sesquidratado	Comprimido revestido gastrorresistente	Nycomed Pharma	Preferir Esomeprazol ou Omeprazol Mups	Risco de obstrução de sonda				-
Parlodel 2,5 mg	Bromocriptina	Comprimido	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Pentasa 500 mg	Mesalazina	Comprimido	Ferring	Diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	50 mL	-
Persantin 75 mg	Dipiridamol	Drágea	Boehringer Ingelheim	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-
Pidomag 1,5 g/10 mL	Pidolato de magnésio	Flaconete	Baldacci	-	NÃO	SIM	-	15 mL	-
Pipuro 400 mg	Ác. pipemídico	Cápsula	Zambon	Medicamento cistostático	Risco ocupacional para o manipulador				-

Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

Risco de obstrução de sonda

Utilizar apenas em condições especiais

Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Pirazinamida 500 mg	Pirazinamida	Comprimido	Posto de saúde do SUS	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	20 mL	-
Planta Bem 5mg	<i>Plantago ovata</i>	Sachê (pó efervescente)	Nycomed Pharma	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-
Plasil 10 mg	Metoclopramida, cloridrato	Comprimido	Sanofi Aventis	Utilizar a opção gotas	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Plasil 4 mg/ml	Metoclopramida, cloridrato	Solução oral	Sanofi Aventis	Utilizar a opção gotas	NÃO	SIM	-	15 mL	-
Plavix 75 mg	Clopidogrel, bissulfato	Comprimido revestido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Plavix 300 mg					SIM	NÃO	++	15 mL	
Polaramine 2 mg	Dexclorfeniramina, maleato	Comprimido	Schering-Plough	Utilizar a opção solução	SIM	SIM	+	20 mL	Pode retardar o esvaziamento gástrico e diminuir a motilidade gastrointestinal
Polaramine 6 mg	Dexclorfeniramina, maleato	Comprimido de liberação prolongada	Schering-Plough	Utilizar a opção solução	-	-	-	-	-
Polaramine	Dexclorfeniramina, maleato	Solução oral	Schering-Plough	-	NÃO	SIM	-	20 mL de água para cada 5 mL da solução oral	Pode retardar o esvaziamento gástrico e diminuir a motilidade gastrointestinal
Ponstan 500 mg	Ác. mefenâmico	Comprimido	Pfizer	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	20 mL	-
Pradaxa 110 mg	Etexilato de dabigatrana	Cápsula	Boehringer Ingelheim	Não recomendado	Risco de alteração farmacocinética				-
Pradaxa 75 mg									
Pravacol 20 mg	Pravastatina sódica	Comprimido	Bristol-Myers Squibb	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++++	15 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Predsin 5 mg e 20 mg	Prednisolona	Comprimido	Mantecorp	Utilizar a opção solução	SIM	NÃO	-	15 mL	-
Predsin 3 mg/mL		Solução			NÃO	SIM	-	15 mL	
Prevax 15 mg	Folinato de cálcio	Comprimido	Biossintética	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM (lento)	++	15 mL	-
Primid 100 mg	Primidona	Comprimido	Apsen	-	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Profenid 20 mg/mL	Cetoprofeno	Solução oral	Sanofi Aventis	-	NÃO	SIM	-	15 mL de água para cada 50 gotas	-
Profenid 50 mg	Cetoprofeno	Cápsula	Sanofi Aventis	Utilizar a opção solução	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Profenid 200 mg	Cetoprofeno	Comprimido de liberação prolongada	Sanofi Aventis	Utilizar a opção solução	NÃO	-	-	-	-
Profenid entérico	Cetoprofeno	Comprimido revestido	Sanofi Aventis	Utilizar a opção solução	NÃO	-	-	-	-
Prograf 1 mg	Tacrolimo	Cápsula	Janssen–Cilag	Abrir a cápsula, diluir e administrar imediatamente	Abrir a cápsula	NÃO	-	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Prograf 5 mg					Abrir a cápsula	NÃO	-	15 mL	
Prolopa HBS	Levodopa/ cloridrato de benserazida	Cápsula	Roche	Utilizar a opção comprimidos dispersíveis	Não recomendado				Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Prolopa dispersível	Levodopa/ cloridrato de benserazida	Comprimido dispersível	Roche	-	NÃO	SIM	++	25-50mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Prolopa 200 / 50 mg	Levodopa / cloridrato de benserazida	Comprimido	Roche	Não recomendado. Preferir a opção Prolopa comprimido dispersível	SIM	SIM (lento)	++++	20 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Propil 100 mg	Propiltiouracila	Comprimido	Pfizer	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	15 mL	-
Propranolol 40 mg	Propranolol, cloridrato	Comprimido	EMS	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM		15 mL	-
Protovit Plus	Polivitamínico	Gotas	Bayer		NÃO	SIM		15 mL para cada 20 gotas	-
Prozac 20 mg	Fuoxetina	Cápsula	Eli Lilly	Preferir solução (Fluoxetina gotas)	Abrir a cápsula	NÃO	+	20 mL	-
Puran T4 100 mg	Levotiroxina sódica	Comprimido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta.
Puran T4 25 mg	Levotiroxina sódica	Comprimido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Purinethol 50 mg	Mercaptopurina	Comprimido	Glaxo SmithKline	Medicamento cistostático	Risco ocupacional para o manipulador				-
Pyridium 100 mg	Fenazopiridina, cloridrato	Drágea	Pfizer	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM (lento)	++++	20 mL	-
Questran	Colestiramina	Envelope	Bristol-Myers Squibb	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-
Quinicardine	Quinidina, sulfato	Comprimido	Barrene	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	-	30 mL	-
Quinoflox 500 mg	Ciprofloxacino	Comprimido revestido	Biolab	Não recomendado. Quando for necessário, triturar, diluir e administrar imediatamente	NÃO	SIM	+++	20 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Rapamune	Sirolimus	Comprimido	Wyeth	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	30 mL	-
Redoxon 200 mg/mL	Ácido ascórbico (vitamina C)	Gotas	Roche	-	NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 5 gotas	-
Remeron Sol Tab 15 mg	Mirtazapina	Comprimido	Schering-Plough	-	NÃO	SIM	++	15 mL	-
Remeron Sol Tab 30 mg		orodispersível			NÃO	SIM	++	15 mL	

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Remeron Sol Tab 15 mg	Mirtazapina	Comprimido orodispersível	Schering–Plough	-	NÃO	SIM	++	15 mL	-
Remeron Sol Tab 30 mg					NÃO	SIM	++	15 mL	
Renagel 800 mg	Sevelamer	Comprimido	Genzyme	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-
Renitec 20 mg	Enalapril, maleato	Comprimido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	15 mL	-
Renitec 5 mg					SIM	SIM	+	15 mL	
Revectina 6 mg	Ivermectina	Comprimido	Solvay	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Rifaldin 300 mg	Rifampicina	Cápsula	Sanofi Aventis	Preferir a opção suspensão	Abrir a cápsula	NÃO	++++	50 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Rifaldin 300 mg	Rifampicina	Suspensão	Sanofi Aventis	-	-	-	-	-	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Risperdal 1 mg	Risperidona	Comprimido revestido	Janssen–Cilag	Preferir a solução oral	SIM	SIM	++	15 mL	-
Risperdal 1 mg/ml		Solução oral			NÃO	SIM	-	10 mL de água para 3 mL da solução	
Ritalina 10 mg	Metilfenidato, cloridrato	Comprimido	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Ritmonorm 300 mg	Propafenoma, cloridrato	Comprimido revestido	Abbott	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Rivaroxabana 10 mg	Rivaroxabana 10 mg	Comprimido revestido	Bayer	Não recomendado	Risco de alterações farmacocinéticas que podem levar a bradicardia				-
Rivotril 0,25 mg	Clonazepam	Comprimido sublingual	Roche	Utilizar a opção solução ou comprimido sublingual	Apresentação sublingual				-
Rivotril 0,5 mg		Comprimido			SIM	SIM	+++	15 mL	
Rivotril 2 mg					SIM	SIM	+++	15 mL	
Rivotril 2,5 mg/mL					Gotas	NÃO	SIM	-	

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Rocaltrol 0,25 mg	Calcitriol	Cápsula gelatinosa dura com conteúdo líquido	Roche	Como alternativa, indica-se o colecalciferol gotas	Não recomendado				-
Rohypnol 1 mg	Flunitrazepam	Comprimido revestido	Roche	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Roxflam 5 mg	Amlodipino, besilato	Comprimido	Merck Sharp & Dohme	Diluir em água e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	15 mL	-
Sandimum Neoral 25 mg	Ciclosporina	Cápsula	Novartis	Preferir solução	Risco ocupacional ao manipulador				-
Sandimum Neoral 100 mg									
Sandimum Neoral 2 mg/ml		Solução oral			NÃO	SIM	-	20 mL de água para cada 4 mL da solução oral	
Secotex ADV 0,4 mg	Tansulosina	Comprimido	Boehringer Ingelheim		SIM	NÃO	++++	10mL	-
Seis-B 300 mg	Piridoxina, cloridrato (vitamina B6)	Comprimido	Apsen	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Seloken 100 mg	Metoprolol, tartarato	Comprimido	AstraZeneca	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	15 mL	-
Selozok 25 mg	Metoprolol, Succinato	Comprimido de liberação controlada	AstraZeneca	Não recomendado	Risco de alterações farmacocinéticas que podem levar a bradicardia				-
Seroquel 25 mg	Quetiapina, fumarato	Comprimido revestido	AstraZeneca	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	20 mL	-
Sífol 0,25 mg	Pramipexol, dicloridrato	Comprimido	Boehringer Ingelheim	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Singulair 10 mg	Montelucaste sódico	Comprimido revestido	Merck Sharp & Dohme	Utilizar a opção em pó (diluir e administrar imediatamente)	SIM	SIM	+++	15 mL	-
Singulair Baby 4 mg		Envelope			NÃO	SIM	-	15 mL	

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Sinvascor 20 mg	Sinvastatina	Comprimido revestido	Baldacci	Não recomendado. Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	20 mL	-
Sirdalud 2 mg	Tizanidina	Comprimido	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Slow-k 600 mg	Cloreto de potássio	Drágea	Novartis	Não recomendado	Utilizar a opção xarope de cloreto de potássio 6%				Risco de obstrução de sonda
Sorcal 30mg	Poliestirenosulfonato de cálcio	Envelope	Wyeth	Não recomendado	Administrar o medicamento via retal				Risco de obstrução de sonda
Sotacor 160 mg	Sotalol, clorid.	Comprimido	Bristol-Myers Squibb	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Sporanox Pulso 100 mg	Itraconazol	Cápsula	Janssen–Cilag	Abrir a cápsula, diluir e administrar imediatamente	NÃO	NÃO	++++	15 mL	-
Stresstabs 600 Zinco	Polivitamínico / Polimineral	Comprimido revestido	Wyeth	Não recomendado	Utilizar polivitamínico e polimineral em solução				Risco de obstrução de sonda
Stilnox 10 mg	Zolpidem	Comprimido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Stugeron 25 mg	Cinarizina	Comprimido	Janssen–Cilag	-	SIM	SIM (lento)	++	15 mL	-
Stugeron 75 mg	Cinarizina	Comprimido	Janssen–Cilag	-	SIM	SIM (lento)	++	15 mL	-
Sucrafilm 1 g	Sucralfato	Comprimido mastigável	Sigma Pharma	É preferível utilizar a opção solução	SIM	NÃO	+++	20 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Sucrafilm 2 g / 10 mL		Solução oral			NÃO	SIM	+	15 mL	
Sulferrol 68 mg/mL	Sulfato ferroso	Solução	Bunker	-	NÃO	SIM	Viscoso	30 - 50 mL	-
Sulferrol 250 mg	Sulfato ferroso	Drágea	Bunker	Utilizar a opção solução	SIM	NÃO	++	20 mL	-
Sulfato ferroso 300 mg		Comprimido	Manipulado Drogamérica		SIM (na água após 5 min)	NÃO	++	20 mL	

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Sumax 25 mg	Sumatriptana	Comprimido	Libbs	-	SIM	NÃO	++++	30 mL	-
Sustrate 10 mg	Propatilnitrato	Comprimido	Bristol-Myers Squibb	É preferido utilizar comprimido via sublingual	SIM	SIM	++	10 mL	-
Sylador 50 mg	Tramadol, cloridrato	Comprimido	Sanofi Aventis	-	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Synthroid 100 mcg	Levotiroxina sódica	Comprimido	Abbott	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Synthroid 25 mcg	Levotiroxina sódica	Comprimido	Abbott	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Teofilina 100 mg	Teofilina	Cápsula de liberação prolongada	Novartis	-	Risco de alteração farmacocinética				-
Teofilina 200 mg									
Teolong 100 mg									
Teolong 200 mg			Knoll						
Tamarine	Cassia angustifolia / Assoc.	Cápsula	DM Hypermarcas	Recomenda-se Tamarine geleia	Risco de obstrução de sonda				-

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Tamarine geleia	<i>Cassia angustifolia</i> / Assoc.	Geleia	DM Hypermarcas	-	NÃO	SIM	-	50 mL para 1 medida (1 colher de sopa)	-
Tamiflu 75 mg	Oseltamivir	Cápsula	Posto de saúde do SUS	Utilizar a opção suspensão	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Tamiflu 12 mg/mL		Suspensão			NÃO	SIM	-	10 mL de água para cada 5 mL da suspensão	
Tapazol 5 mg	Tiamazol	Comprimido	Biolab	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Tarceva 150 mg	Erlotinibe	Comprimido revestido	Roche	Medicamento citostático	Risco ocupacional para o manipulador				-
Teboni 80 mg	Ginkgo Biloba	Comprimido	Altana	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+++	20 mL	-
Tegretol 200 mg	Carbamazepina	Comprimido revestido	Novartis	Utilizar a opção suspensão	NÃO	SIM	++++	20 mL	-
Tegretol CR Divitabs 400 mg	Carbamazepina	Comprimido divisível de liberação controlada	Novartis	Utilizar a opção suspensão	Não recomendado				-
Tegretol CR Divitabs 200 mg	Carbamazepina								
Tegretol 2% solução oral	Carbamazepina	Solução	Novartis	-	NÃO	SIM	-	50 mL de água para cada 5 mL da solução	A suspensão oral contém sorbitol, podendo causar distúrbio estomacal e diarreia
Temodal 100 mg	Temozolamida	Cápsula	Schering-Plough	Não recomendado	Abrir a cápsula	NÃO	+	10 mL	Risco de obstrução de sonda
Temodal 20 mg					Abrir a cápsula	NÃO	+	20 mL	

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Tenoretic 100/25 mg	Atenolol/ clortalidona	Comprimido	AstraZeneca	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	15 mL	-
Tetrex 500 mg	Tetraciclina	Cápsula	Bristol-Myers Squibb	Abrir a cápsula	SIM	SIM	++	20 - 40 mL	-
Thiaben 500 mg	Tiabendazol	Comprimido	UCI-Farma	Preferir suspensão	SIM	SIM	++	20 mL	-
Thiaben 50 mg/mL		Suspensão			SIM	NÃO	-	20 mL de água para cada 10 mL da suspensão	
Ticlid 250 mg	Tioclopidina	Comprimido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Tilatil 20 mg	Tenoxicam	Comprimido	Roche	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-
Tiorfan 100 mg	Racecadotril	Cápsula	Bagó	Triturar, diluir e administrar imediatamente	Abrir a cápsula	NÃO	++	15 mL	-
Tofranil 10 mg	Imipramina, cloridrato	Drágea	Novartis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Tofranil 25 mg					SIM	NÃO	++	15 mL	
Topamax Sprinkle 25 mg	Topiramato	Cápsula de liberação lenta	Janssen-Cilag	Não recomendado	Utilizar o comprimido				-
Topamax 25 mg	Topiramato	Comprimido revestido	Janssen-Cilag	Quando necessário, utilizar a opção em comprimido revestido, triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
Topamax 50 mg					SIM	NÃO	+	15 mL	
Tramal 100 mg/mL	-	Solução oral	Janssen-Cilag	-	NÃO	SIM	-	20 mL	-
Tramadol, Cloridrato 50 mg		Cápsula	Teuto		Abrir a cápsula	NÃO	+++	15 mL	
Transamin 250 mg	Ácido tranexâmico	Comprimido	Nikkho	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+++	20 - 50 mL	-

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Trental 400 mg	Pentoxifilina	Comprimido revestido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	-	50 - 100 mL	-
Trileptal 300 mg	Oxcarbazepina	Comprimido revestido	Novartis	Utilizar a opção suspensão	SIM	SIM	++	15 mL	-
Trileptal 6%	Oxcarbazepina	Suspensão	Novartis	-	NÃO	SIM	-	30 - 50 mL de água para cada 10 mL	-
Tryptanol 25 mg	Amitriptilina, cloridrato	Comprimido revestido	Merck Sharp & Dohme	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Tylenol 500 mg	Paracetamol	Comprimido	Janssen-Cilag	Utilizar a solução oral ou gotas	SIM	NÃO	+++	20 - 40 mL	-
Tylenol 750 mg	Paracetamol	Comprimido	Janssen-Cilag	Utilizar a solução oral ou gotas	SIM	NÃO	+++	20 - 40 mL	-
Tylenol criança 160 mg/5 mL	Paracetamol	Solução oral	Janssen-Cilag	-	NÃO	SIM	-	50 mL de água para cada 5 mL da solução	-
Tylenol 200 mg/mL gotas	Paracetamol	Gotas	Janssen-Cilag	-	NÃO	SIM	-	15 mL	-
Tylen 30 mg (500 mg Paracetamol)	Paracetamol/Codeína, fosfato	Comprimido	Janssen-Cilag	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++++	20 mL	-
Tylen 7,5 mg (500 mg Paracetamol)					SIM	SIM	++++	20 mL	
Ultracet 37,5 mg/325 mg	Tramadol, clorid. / Paracetamol	Comprimido	Janssen-Cilag	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++	20 mL	-
Unasyn 375 mg	Ampicilina/Sulbactam	Comprimido revestido	Pfizer	Utilizar suspensão	Risco de obstrução de sonda				-
Unazyn suspensão	Ampicilina/Sulbactam	Suspensão	Pfizer	-	NÃO	SIM	-	20 mL de água para cada 10 mL da suspensão reconstituída	-
Urbanil 10 mg	Clobazam	Comprimido	Sanofi Aventis	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	15 mL	-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Ursacol 150 mg	Ácido ursodesoxicólico	Comprimido	Zambon	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	-
V Fend 200 mg	Voriconazol	Comprimido revestido	Pfizer	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM (lento)	+	20 mL	Dieta cíclica: pausar dieta 1 hora antes e após a administração do medicamento. Dieta intermitente: administrar medicamento 1 hora antes ou 2 horas após a dieta
Valium 5 mg	Diazepam	Comprimido	Roche	Existe a opção sublingual Diazefast	SIM	SIM (lento)	+ / ++	15 mL	-
Valpakine 500 mg	Valproato de sódio	Comprimido revestido	Sanofi Aventis	Não recomendado	Oferecer as opções em xarope (divalproato de sódio/Depakene)				Risco de obstrução de sonda
Valtrex 500 mg	Valaciclovir	Comprimido	GlaxoSmith Kline	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	++++	20 mL	-
Vascase 2,5 mg	Cilazapril	Comprimido	Roche	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	20 mL	-
Vascase 5 mg	Cilazapril	Comprimido	Roche	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	20 mL	-
Venalot	Cumarina / Troxerrutina	Drágea	Altana	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-
Vepesid 50 mg	Etoposido	Cápsula	Bristol-Myers Squibb	Medicamento citostático	Risco ocupacional para o manipulador				-
Viagra 50 mg	Sildenafil	Comprimido	Pfizer	-	SIM	SIM (lento)	+++	20 mL	-
Vibramicina 100 mg	Doxiciclina monoidratada	Comprimido solúvel	Pfizer	Dissolver em 50 mL de água antes da administração e administrar imediatamente	NÃO	SIM	+	50 mL	-
Virazole 250 mg	Ribavirina	Cápsula	UCI-Farma	-	Abrir a cápsula	SIM	++	10 mL	-
Vita E 400 mg	Acetato de racealfatocoferol (vitamina E)	Cápsula gelatinosa	Aché	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Voltarem 50 mg	Diclofenaco sódico	Comprimido revestido	Novartis	Pode ser triturado, porém haverá perda do efeito protetor da mucosa gástrica. Como alternativa, pode-se utilizar outros AINES (ex. Ibuprofeno), ou utilizar a opção supositório VR	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Voltarem Retard 100 mg	Diclofenaco sódico	Comprimido de liberação lenta	Novartis	Não recomendado	Não recomendado				-
Vonau Flash 4 mg	Vide Zofran página 80								
Xarelto 10 mg	Rivaroxabana 10mg	Comprimido revestido	Bayer	Não recomendado	Risco de alteração farmacocinética				-
Xarelto 15 mg	Rivaroxabana 15mg	Comprimido revestido	Bayer	Não recomendado	Risco de alteração farmacocinética				-
Xeloda	Capecitabina	Comprimido revestido	Roche	Medicamento citostático	Risco ocupacional para o manipulador				-
Zaditen 0,2 mg/mL	Cetotifeno	Xarope	Novartis	-	NÃO	SIM	-	20 mL de água para cada 10 mL de xarope	-
Zentel 4%	Albendazol	Suspensão	GlaxoSmith Kline	Utilizar a opção suspensão (Zentel suspensão)	NÃO	SIM	-	15 mL	-
Zolben 400 mg		Comprimido	Sanofi Aventis		SIM	SIM (lento)	++++	20 - 30 mL	
Zestril 10 mg	Lisinopril	Comprimido	AstraZeneca	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++++	15 mL	-
Zinnat 250 mg	Cefuroxima	Comprimido revestido	GlaxoSmith Kline	Utilizar a opção solução	SIM	SIM	+	15 mL	-
Zinnat 250 mg/5 mL		Solução			NÃO	SIM	++	20 mL de água para cada 10 mL da solução	

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Zitromax 500 mg	Azitromicina diidratada	Comprimido revestido	Pfizer	Utilizar a opção suspensão (Zentel suspensão)	-				-
Zitromax 200 mg / 5 mL	Azitromicina diidratada	Suspensão	Pfizer	-	NÃO	SIM	+++	10 mL de suspensão para cada 30 - 50 mL de água	-
Zocor 10 mg	Sinvastatina	Comprimido revestido	Merck Sharp & Dohme	Não recomendado. Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM (lento)	++	15 mL	-
Zofran 4 mg	Ondansetrone	Comprimido revestido	GlaxoSmith Kline	Utilizar a opção sublingual (Vonau Flash)	SIM	SIM	++	15 mL	-
Vonau Flash 4mg		Comprimido sublingual	Biolab	-	-				
Zoloft 50 mg	Sertralina	Comprimido	Pfizer	Diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM (lento)	+++	20 mL	-
Zoltec 100 mg	Fluconazol	Cápsula	Pfizer	Abrir a cápsula, diluir e administrar imediatamente. Não usar sondas de PVC	Abrir a cápsula	NÃO	++	15 mL	-
Zoltec 50 mg					Abrir a cápsula	NÃO		15 mL	
Zomig OD	Zolmitriptana	Comprimido orodispersível	AstraZeneca	Dissolvido sobre a língua	NÃO	NÃO	-	10 mL	-
Zomi 2,5 mg	Zolmitriptana	Comprimido revestido	AstraZeneca	Não recomendado. Sugerir opção Zomig OD (orodispersível) ou quando necessário, triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	NÃO	+	15 mL	Risco de obstrução de sonda
Zovirax 200 mg	Aciclovir	Comprimido	Glaxo Wellcome	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	++	20 mL	-
Zyban 150 mg	Bupropiona, cloridrato	Comprimido de ação prolongada	GlaxoSmith Kline	Não recomendado	Risco de alteração farmacocinética				-
Zylum 150 mg	Ranitidina	Comprimido	Farmasa	Utilizar preferencialmente a opção xarope	Sim	SIM	++	15 mL	-
Zyloric 100 mg	Alopurinol	Comprimido	GlaxoSmith Kline	Os comprimidos podem ser triturados, diluídos e administrados imediatamente	SIM	SIM	+++	20 mL	-
Zyloric 300 mg					SIM	SIM	+++	20 mL	

 Risco ocupacional (utilizar luvas e máscara no manuseio)

 Risco de obstrução de sonda

 Utilizar apenas em condições especiais

 Não recomendado

NOME COMERCIAL	MEDICAMENTO GENÉRICO	FORMA FARMACÊUTICA	FABRICANTE	TRITURAÇÃO, DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	TRITURAR SIM / NÃO	DISSOLVE SEM TRITURAÇÃO	RESÍDUO	VOLUME DE ÁGUA PARA DILUIR	OBSERVAÇÕES GERAIS
Zyprexa 10 mg	Olanzapina	Comprimido revestido	Eli Lilly	Não recomendado	Risco de obstrução de sonda				-
Zyprexa 2,5 mg									
Zyrtec 10 mg	Certirizina	Comprimido	GlaxoSmith Kline	Utilizar preferencialmente a opção solução	SIM	NÃO	++	15 mL	-
Zyrtec	Certirizina	Solução oral	GlaxoSmith Kline	-	-	-	++	15 mL	-
Zyvox 600 mg	Linezolida	Comprimido	Pfizer	Triturar, diluir e administrar imediatamente	SIM	SIM	+	20 mL	-



HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS

Rua Dona Adma Jafet, 91 • Bela Vista
CEP 01308-50 • São Paulo • SP • Brasil

www.hospitalsiriolibanes.org.br